

Die Berichte der Beobachtungsgemeinschaft Windischleubaer Stausee (Bibliographie)

NORBERT HÖSER

26 Jahre lang erschienen die Berichte der Beobachtungsgemeinschaft Windischleubaer Stausee, der letzte derartig bezeichnete im Jahre 1980. Es waren im wesentlichen avifaunistische Mitteilungen, zumeist Neuigkeiten und Besonderheiten, daneben auch mehrere grundlegende Darstellungen des Durchzuges von Wasservogelarten, insbesondere Limikolen. Diese Arbeiten sind noch immer Quellen der Kenntnis der mitteleuropäischen Fauna.

Daneben wurden brutbiologische, ethologische und ökologische Angaben veröffentlicht, u. a. auch eine Diplomarbeit [12].

Im Vordergrund stand die Beobachtung des Vogelzuges. Die sorgfältige Behandlung subtiler Beobachtungen war üblich, ohne die seltenen Sichtbeobachtungen überzubewerten und das Sammeln von Belegen zu vernachlässigen [13]. Die Reihe der Berichte endete, als sich F. FRIELING auf die avifaunistische Bearbeitung der Eschefelder Teiche zurückzog. Für eine Fortsetzung wurde N. HÖSER die Unterstützung versagt, andererseits aber das Datensammeln an fruchtloser Stelle gefördert. Der Versuch, Unterstützung in einem größeren Rahmen zu erhalten, brachte vorerst nur die Berichte von 1985 und 1986 [68, 69].

Die folgende Bibliographie enthält die 57 Berichte der Beobachtungsgemeinschaft:

- [1] SCHLENKER, R. (1954): Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) bei Windischleuba und Eschefeld. — Beitr. Vogelk., 3, 304–305
- [2] WEISS, R.; HANOLDT, W. (1955): Zur Jagdweise des Wanderfalken. — Beitr. Vogelk., 4, 166–167
- [3] GRUMMT, W. (1956): Abermals über stoßtauchende Lachmöwen. — Beitr. Vogelk., 4, 249
- [4] FRIELING, F. (1956): Gehäuftes Auftreten der Zwergschnepfe, *Lymnocyptes minimus*, auf dem Frühjahrszug 1955 in Westsachsen. — Beitr. Vogelk., 4, 255–256
- [5] FRIELING, F. (1955): Seltenheiten am Windischleubaer Stausee im Frühjahr und Sommer 1953. — Beitr. Vogelk., 5, 32–35
- [6] SCHUBERT, P. (1956): Nachweis des Sichelstrandläufers (*Calidris ferruginea*) auf dem Frühjahrszug in Ostthüringen. — Beitr. Vogelk., 4, 322
- [7] FRIELING, F. (1958): Besondere Beobachtungen am Windischleubaer Stausee im Jahre 1954. — Beitr. Vogelk., 5, 301–303
- [8] FRIELING, F. (1959): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee im Jahre 1955. — Beitr. Vogelk., 6, 356–358
- [9] FRIELING, F. (1960): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee im Jahre 1956. — Beitr. Vogelk., 7, 21–24
- [10] FRIELING, F.; KIRCHHOF, W.; TRENMANN, D.; WAGNER, S. (1960): Seltene Gäste aus dem Süden am Windischleubaer Stausee. — Beitr. Vogelk., 7, 139–141
- [11] FRIELING, F. (1961): Der Durchzug der Limikolen am Windischleubaer Stausee. — Beitr. Vogelk., 7, 252–263
- [12] WAGNER, S. (1962): Über Verhalten und Brutbiologie des Bleßhuhns (*Fulica atra*). — Beitr. Vogelk., 7, 381–440
- [13] KIRCHHOF, W.; KARG, W. (1962): Zwei weitere Nachweise des Graubruststrandläufers, *Calidris melanotos* (Vieill.), in Deutschland. — J. Orn., 103, 287–288
- [14] FRIELING, F. (1962): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1957. — Beitr. Vogelk., 8, 142–143
- [15] FRIELING, F. (1963): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1958. — Beitr. Vogelk., 8, 291–293
- [16] FRIELING, F. (1963): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1959. — Beitr. Vogelk., 8, 338–340

- [17] FRIELING, F. (1958): Zum Durchzug von Kiebitz und Graureiher am Windischleubaer Stausee. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **1**, 50–55
- [18] FRIELING, F. (1960): Der Durchzug des Fischadlers, *Pandion haliaetus* (L.), an den Frohburg–Eschefelder Teichen und am Windischleubaer Stausee. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **2**, 102–105
- [19] TRENMANN, D.; KARG, W. (1960): Das Vorkommen der Entenvögel (Anatidae) im Kreis Altenburg. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **2**, 106–165 (und **3**, 131 bis 132)
- [20] FRIELING, F. (1963): Durchzug der Binnenseeschwalben (*Chlidonias*) und der Zwergmöwe (*Larus minutus*) bei Frohburg und Windischleuba. — Beitr. Vogelk., **8**, 349–352
- [21] KARG, W. (1963): Das Vorkommen der Seetaucher (Gaviidae) und Lappentaucher (Podicipidae) im Kreis Altenburg. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **3**, 103–116
- [22] TRENMANN, D. (1963): Das Vorkommen der Rallenvögel (Rallidae) im Kreis Altenburg. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **3**, 117–131
- [23] FRIELING, F. (1963): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1960. — Beitr. Vogelk., **8**, 440–442
- [24] MAUERSBERGER, G. (1963): Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis*, in Windischleuba. — Beitr. Vogelk., **8**, 469
- [25] GRUMMT, F. (1964): Mittelschnepfe, *Gallinago media* (Lath.), in Ostthüringen und in der Mark. — Beitr. Vogelk., **8**, 379
- [26] FRIELING, F. (1964): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1961. — Beitr. Vogelk., **9**, 429–432
- [27] FRIELING, F. (1964): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1962. — Beitr. Vogelk., **10**, 210–213
- [28] FRIELING, F. (1965): Der Durchzug des Kampfjägers, *Philomachus pugnax*, am Windischleubaer Stausee während der 10 Beobachtungsjahre 1953 bis 1963. — Beitr. Vogelk., **10**, 257–262
- [29] FRIELING, F.; TRENMANN, D. (1965): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1963. — Beitr. Vogelk., **10**, 396–399
- [30] FRIELING, F. (1966): Zum Durchzug des Bruchwasserläufers, *Tringa glareola*, in Windischleuba. — Beitr. Vogelk., **11**, 296–301
- [31] FRIELING, F.; TRENMANN, D. (1966): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1964. — Beitr. Vogelk., **11**, 379–381
- [32] FRIELING, F.; TRENMANN, D. (1967): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1965. — Beitr. Vogelk., **12**, 257–261
- [33] TRENMANN, D. (1967): Das Vorkommen der Raubmöwen (Stercorariidae), Möwen (Laridae) und Seeschwalben (Sternidae) im Kreis Altenburg. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **5**, 267–319
- [34] HÖSER, N. (1967): Das Vorkommen der Greifvögel (Accipitridae und Falconidae) im Kreis Altenburg. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **5**, 321–353
- [35] FRIELING, F.; TRENMANN, D. (1968): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1966. — Beitr. Vogelk., **14**, 168–171
- [36] FRIELING, F. (1970): Ergänzungen zum Durchzug der Limikolen am Windischleubaer Stausee. — Beitr. Vogelk., **16**, 101–108
- [37] FRIELING, F.; HÖSER, N. (1971): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1967 und 1968. — Beitr. Vogelk., **17**, 424–427
- [38] FRIELING, F. (1971): Bedeutung des Windischleubaer Stausees als Reservat für unsere Wildenten. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **7**, 31–48
- [39] FRIELING, F.; HÖSER, N. (1972): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1969. — Beitr. Vogelk., **18**, 399–400
- [40] FRIELING, F.; HÖSER, N. (1973): Das Geschlechtsverhältnis durchziehender Tafelenten, *Aythya ferina*, im Frühjahr in Windischleuba. — Beitr. Vogelk., **19**, 296–305
- [41] STEINBACH, R. (1973): Die Ansiedlung der Reiherente (*Aythya fuligula*) in den Kreisen Altenburg und Geithain. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **8**, 61–65
- [42] HÖSER, N. (1973): Bestimmung und Interpretation der Artendichte (species-diversity) von Vogelbeständen aus Zählergebnissen unterschiedlichen mathematischen und biologischen Charakters. — Beitr. Vogelk., **19**, 313–328
- [43] FRIELING, F.; HÖSER, N. (1973): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1970. — Beitr. Vogelk., **19**, 424–429
- [44] FRIELING, F.; HÖSER, N. (1974): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1971. — Beitr. Vogelk., **20**, 216–220

- [45] STEINBACH, R. (1974): Vorkommen der Wasserröter *Phalaropus lobatus* (L.) und *Phalaropus fulicarius* (L.) im Gebiet der Haselbacher und Eschefelder Teiche sowie am Speicherbecken Windischleuba. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **8**, 333–338
- [46] STEINBACH, R. (1974): Das Vorkommen des Rotkehlpiepers, *Anthus cervinus* (PALLAS) am Speicherbecken Windischleuba. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **8**, 339–342
- [47] FRIELING, F.; HÖSER, N. (1975): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1972. — Beitr. Vogelk., **21**, 127–131
- [48] FRIELING, F.; STEINBACH, R. (1975): Der Durchzug der Zwergmöwe (*Larus minutus* PALL.) am Windischleubaer Speicherbecken. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **9**, 17–26
- [49] FRIELING, F.; HÖSER, N. (1975): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1973. — Beitr. Vogelk., **21**, 447–451
- [50] STEINBACH, R. (1976): Der Berg-Wasserpieper, *Anthus spinoletta spinoletta* (L.) als Durchzügler und Wintergast am Speicherbecken Windischleuba 1954 bis Frühjahr 1974. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **9**, 129–136
- [51] FRIELING, F.; STEINBACH, R. (1977): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1974. — Beitr. Vogelk., **23**, 79–82
- [52] FRIELING, F.; STEINBACH, R. (1977): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1975. — Beitr. Vogelk., **23**, 297–300
- [53] FRIELING, F.; HÖSER, N.; STEINBACH, R. (1978): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1976. — Beitr. Vogelk., **24**, 153–156
- [54] HÖSER, N. (1979): Zu Anzahl, Phänologie und Ökologie der Brutvögel 1978 und 1979 an den Gewässern bei Windischleuba. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **10**, 297–304
- [55] HÖSER, N. (1980): 25 Jahre Windischleubaer Feldornithologie — Entwicklung und Ziele. — Beitr. Vogelk., **26**, 241–244
- [56] FRIELING, F.; HÖSER, N.; STEINBACH, R. (1980): 25 Jahre Beobachtungsgemeinschaft Windischleubaer Stausee. Die Besonderheiten 1977. — Beitr. Vogelk., **26**, 245–248
- [57] FRIELING, F. (1980): Zum Durchzug der Limikolen und der Beutelmeise nach 25jähriger Kontrolle 1953–1977. — Beitr. Vogelk., **26**, 249–252

Die bibliographische Fortsetzung umfaßt weitere Arbeiten bis 1992, die im wesentlichen auf Beobachtungen vom Stausee Windischleuba fußen:

- [58] STEINBACH, R. (1977): Verstärkter Durchzug des Rotkehlpiepers, *Anthus cervinus* (PALLAS) im Frühjahr 1976 in den Kreisen Altenburg, Borna und Geithain. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **9**, 305–307
- [59] STEINBACH, R. (1977): Noch einmal zum Thema "Belly-Soaking" bei den Charadriiformes. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **9**, 309–311
- [60] STEINBACH, R. (1982): Erfolgreiche Brut der Schwarzkopfmöwe, *Larus melanocephalus* Temminck, am Speicherbecken Windischleuba 1980. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **11**, 16
- [61] HÖSER, N. (1982): Bemerkungen zur Bewertung seltener avifaunistischer Sichtbeobachtungen. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **11**, 34
- [62] HÖSER, N. (1982): Seeregenvieher, *Charadrius alexandrinus* L., am Stausee Windischleuba. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **11**, 42
- [63] BRÄUTIGAM, H. (1983): Der Durchzug des Kormorans, *Phalacrocorax carbo*, im Bezirk Leipzig (1950–1979). — Actitis, **22**, 2–7
- [64] BRÄUTIGAM, H. (1984): Ein weiterer Nachweis des Buschrohrsängers, *Acrocephalus dumetorum* Blyth, für die DDR. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **11**, 215–216
- [65] HÖSER, N. (1985): Durchzug und Flügelmaße des Weißsternigen Blaukehlchens, *Luscinia svecica cyaneola*, bei Altenburg. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **11**, 345–350
- [66] HÖSER, N. (1985): Einige seltene Vogelarten 1978–1984 am Stausee Windischleuba. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **11**, 351–353
- [67] HÖSER, N. (1985): Walter Kirchhof 54 Jahre Vogelberinger. — Abh. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum Altenburg, **11**, 361–369
- [68] ROST, F.; STEINBACH, R.; HÖSER, N. (1987): Avifaunistische Besonderheiten im Pleiße-Wyhra-Gebiet 1985. — Mauritiana, **12**, 197–201
- [69] ROST, F.; STEINBACH, R.; VOGEL, B. (1989): Avifaunistischer Jahresbericht für 1986 aus dem Pleiße-Wyhra-Gebiet. — Mauritiana, **12**, 381–386
- [70] HÖSER, N. (1989): Durchzug des Schilfrohrsängers, *Acrocephalus schoenobaenus*, nach Fangergebnissen und Flügelmaßen bei Altenburg. — Mauritiana, **12**, 405–406

- [71] HÖSER, N. (1991): Erster Nachweis einer Brut des Graureihers, *Ardea cinerea*, bei Altenburg. — *Mauritiana*, **13**, 246
- [72] HÖSER, N. (1992): Die Berichte der Beobachtungsgemeinschaft Windischleubaer Stausee. — *Mauritiana*, **13**, 537—540

1975 wurde die Beobachtungsgemeinschaft gestört, als eine kritische Bewertung (Actitis **10**, 4—113) unkorrekterweise auf die Windischleubaer Veröffentlichungen ausgedehnt wurde. Die Störer schlugen sich durch ihre methodische Schwäche selbst aus dem Feld (vgl. Beitr. Vogelk., **24**, 364—365), beschworen aber eine Krise herauf. Zeitweise ging die avifaunistische Übersicht verloren, was die Zuarbeit zum Buch „Vogelwelt Sachsens“ erschwerte. Diese Arbeit zeigte, daß der Stausee Windischleuba der bedeutendste Platz für Rast und Durchzug der Wasservögel im sächsisch-thüringischen Raum ist. Neue Bedingungen im organisatorischen Umfeld lassen hoffen, daß an die Blütezeit der Beobachtungsgemeinschaft angeknüpft werden kann. Erneut wurde das ornithologische Beobachtungsbuch eingeführt, das im Gasthof Pähnitz ausliegt.

Eingegangen am 17. 3. 1992

Dipl.-Biol. Dr. NORBERT HÖSER, Mauritianum, PSF 216, O-7400 Altenburg/Thür.

Nachrichten

Tagung zum Jubiläum der Frohburger Ornithologen. — Mit einer Tagung am 4. April 1992 im „Schützenhaus“ Frohburg begingen sächsische, thüringische und osterländische Ornithologen und Naturschützer das 25jährige Bestehen der Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz Frohburg. Eingeladen hatte die von R. BAHNDORF geleitete Regionalgruppe Eschefeld des Naturschutzbundes Deutschland. Versammlungsleiter G. DELLING konnte 24 Teilnehmer begrüßen. J. FEILOTTER umriß die Geschichte der Fachgruppe: Am 1. 4. 67 hatten sich auf Anregung von Hanna BELKNER 24 Gründungsmitglieder zusammengefunden. Sie legten die Leitung in die Hände von J. FEILOTTER, der Erfahrungen vom Besuch der Leipziger Fachgruppe aus seiner Studentenzeit mitbrachte und sich mehr als zwei Jahrzehnte lang dieser Aufgabe widmete. Zeugnis der Erfolge sind u. a. die avifaunistische Kartei, die vom Eschefelder Teichgebiet auf das Kreisgebiet Geithain ausgedehnten avifaunistischen Jahresberichte und die Auswertungen, die F. FRIELING vorlegte.

Im weiteren Verlauf der Tagung stellte S. WOLF (Frohburg) die Entwicklung des Wasservogel-Brutbestandes der Eschefelder Teiche vor. Dr. N. HÖSER gab mit mehreren Graphiken Einblick in die endogene Jahresperiodik, ihre genetische Festlegung, und in die Konsequenzen des Wanderverhaltens von Teilziehern und Weitstreckenziehern. Beim Vergleich von Mönchsgrasmücke und Gartengrasmücke griff er auf die Ergebnisse vom Lödlaer Registrierfang zurück. R. STEINBACH stellte Ergebnisse seiner Linientaxierungen der Vogelbestände vor und leitete für die meisten Arten Bestandesrückgang ab. Mit Farblichbildern gab D. ZANGE (Geithain) einen Überblick vom Kenntnisstand der Herpetofauna des Kreises Geithain. Zwischen den Referaten hatte F. FRIELING sein Gedicht von der Brandgans auf dem Eise des Lindenvorwerkteiches vorgetragen, und am Nachmittag fand eine Exkursion in das Eschefelder Teichgebiet statt.

N. Höser