

Avifaunistische Notizen von zwei Teichgebieten in Siebenbürgen und in der Crisana (Rumänien).

— Während unserer zweiten Siebenbürgen-Exkursion konnten wir zwei bemerkenswerte Wasservogelkonzentrationen feststellen.

Am 19. Oktober 1993 beobachteten wir bei kurzem Aufenthalt an den Teichen von Bradeni (Bezirk Sibiu). Die Lufttemperatur betrug 14 °C, der Himmel war bedeckt. Wir fanden vor: 1 ad. Sterntaucher (*Gavia stellata*) im Schlichtkleid, 2 juv. Prachtaucher (*Gavia arctica*), 27 Haubentaucher, 3 Zwergtaucher, 28 Graureiher, 2 Stockenten, 25 Tafelenten (19,6), 9 Reiherenten (5,4), 1 immat. Seeadler (*Haliaeetus albicilla*), 205 Bläßbrallen (davon mehrere juv.), 7 Lachmöwen, 160 Stieglitze, 40 Nebelkrähen, u. a. Schon am 18. September 93 hatte hier P. WEBER ebenfalls einen Sterntaucher und zwei Prachtaucher festgestellt. Beide Arten sind in Siebenbürgen regelmäßige Durchzügler in geringer Zahl und seltene Wintergäste, wobei *G. stellata* der selteneren von beiden ist (SALMEN 1980, KLEMM u. KOHL 1988).

Am 22. Oktober 1993 konnten wir am Nachmittag bei sonnigem Wetter und 19 °C Lufttemperatur die Teiche zwischen Chisineu Cris und Socodor im rumänischen Grenzgebiet der Crisana besuchen. Besonders der große westliche Teich, der nur wenige Zentimeter Wassertiefe hatte, war vogelreich. Insgesamt wurden u. a. festgestellt: 8 Graureiher, 9 Silberreiher (*Egretta alba*), 1 juv. Kuhreiher (*Bubulcus ibis*), 430 Stockenten, 60 Krickenten, 1 Knäkente, 30 Tafelenten, 1 ♀ Rohrweihe, 1 Wanderfalke, 120 Bläßbrallen, 3 Säbelschnäbler, 26 Goldregenpfeifer (25 juv., 1 ad.), 2100 Kiebitze, mehrere Alpenstrandläufer und Große Brachvögel jeweils rufend, 3 Dunkle Wasserläufer (juv.), 1 Rotschenkel, 1 Bekassine, 650 Lachmöwen, 1 immat. Sturmmöwe, 34 Weißkopfmöwen (*Larus cachinnans*), davon 6 juv.; 2 Heidelerchen, 10 Haubenlerchen, 10 Rohrammern, 15 Stieglitze, 9 Bluthänflinge, 200 Stare. Wohl jahreszeitgemäß waren keine Seidenreiher anzutreffen. Der reinweiße Kuhreiher fiel u. a. durch den vergleichsweise sehr kurzen, hellen Schnabel und die bräunlichen Beine auf. Die Art ist in Rumänien Irrgast (vgl. WEBER 1993).

Literatur

- KLEMM, W., u. St. KOHL (1988): Die Ornis Siebenbürgens. Band III (Studia Transylvanica 8/III). — Köln, Wien
SALMEN, H. (1980): Die Ornis Siebenbürgens. Band I (Studia Transylvanica 8/I). — Köln, Wien
WEBER, P. (1993): Sosire timpurie a unor oaspeti nordici. — Bul. Inform. Soc. Orn. Romăna, 3/1993, 4
WEBER, P. (1993): Stircul de Cireada — *Bubulcus ibis* — si in vestul Romaniei. — Bul. Inform. Soc. Orn. Romăna, 3/1993, 4

Eingegangen am 21. 2. 1994

Dr. NORBERT HÖSER, MIKE JESSAT, MICHAEL HÖSER; Mauritanium, Postfach 216, D-04582 Altenburg/Thür.

Berichtigungen

In Mauritiana 14, Heft 2 (1993), muß es auf S. 149 in der 31. Zeile von unten richtig heißen: „1200 Gänse am 21. 11., 6500 am 27. 11., ...“.

In Mauritiana 14, Heft 3 (1993), ist auf S. 244 in der linken Spalte folgendermaßen zu korrigieren: 11. Zeile: *Bembidion properans* STEPH.; 12. Zeile streichen; 14. Zeile: *Bembidion tetragrammum* ssp. *illigeri*; 15. Zeile: *Bembidion tetracolum*.