

## 4. Beitrag zur Pilzflora von Altenburg Der Leinawald

Mit 2 Abbildungen und 1 Übersichtsskizze

WALTER HOFMANN

### Einleitung

Meine letzte Veröffentlichung (1967) betraf die Pilzflora im Altenburger Stadtwald. Heute folgt eine weitere Fortsetzung der Pilzflora unserer Umgebung.

Die Nomenklatur habe ich meistens aus MOSER, Basidiomyceten (1967) und die Eingliederung nach dem neuesten Stand von Dr. KREISEL, Grundzüge eines natürlichen Systems der Pilze (1969) entnommen.

Der Leinawald wurde pilzkundlich, soweit ich ermittelt habe, seit Ende des ersten Weltkrieges beobachtet.

Die außerpilzkundlichen Angaben stammen aus verschiedenen Schriften, wofür ich an erster Stelle Herrn H. GROSSE, und über die forstkundlichen Angaben Herrn KRELLER, zu Dank verpflichtet bin.

### Allgemeines

Die Leina ist mit etwa 1850 ha im Altenburger Ackerbaugebiet die größte Waldfläche. Sie liegt im Süden des Bezirkes Leipzig, etwa 5 km östlich der Stadt Altenburg. Als eine Waldwirtschaftseinheit, früher im herzoglichen Besitz, gehört die Leina heute zum Staatlichen Forstwirtschaftsbereich Grimma. Sie setzt sich aus den Revieren Schömbach, Lohma und Altmörbitz (vormals Bocka) zusammen.

### Lage und Boden

Die Oberfläche ist, abgesehen von einzelnen zumeist nach Süden oder Westen abgedachten Terrassenhängen, am Rande von Erosionstälern im allgemeinen nur sehr sanft. Das Landschaftsbild kann als nur wenig

gewellt bis schwach hügelig angesprochen werden (Ostthüringisch-Mittelsächsisches Hügelland). Der Gesamthöhenunterschied ist nur gering. Der höchste Punkt der Leina liegt 230 m über NN, die tiefste Punkt 175 m über NN (Abteilung 4). Das bedeutet eine Höhendifferenz von nur 55 m auf eine Entfernung von 6 km. Zwischen diesen Punkten fällt das




Abb. 1

Gelände von SO nach NW zu ab. Dieser Abfall erfolgt sehr ungleichmäßig. Größere Flächen liegen fast völlig horizontal, so daß der Wasserabfluß dort sehr langsam erfolgen kann, während an anderen Stellen, wie z. B. längs des Spannerbaches, ein ziemlich steiler terrassenförmiger Absturz erfolgt. Die Entwässerung der Leina übernimmt zum größten Teil der Spannerbach mit seinen Nebenbächen, dem oberen und unteren Teichgraben. Im östlichen Teil entwässert die Wiera.

Der Leinawald wird begrenzt von den geographischen Koordinaten  $50^{\circ} 57'$  und  $51^{\circ} 30'$  nördlicher Breite sowie  $12^{\circ} 30'$  und  $12^{\circ} 35'$  östlicher Länge.

Die Oberfläche des gesamten Waldgebietes besteht ursprünglich im wesentlichen aus einer vorwiegend 1–2 m mächtigen, diluvialen Lößlehmdecke (Altenburger Lößlehmgebiet).

## Klima

Nach KIRSTE liegt das Altenburger Gebiet fast im Schnittpunkt zweier Wetterstraßen, nämlich bei Nordwest-Wetterlage im Regenschatten des Harzes und bei Südwest-Wetterlage im Regenschatten des Ostthüringischen Schiefergebirges. Die Niederschlagsmessungen lassen ebenfalls den Eindruck entstehen, daß die Altenburger Gegend ein Übergangsbereich von dem Thüringischen Trockengebiet um Erfurt/Weimar (Jahressumme unter 500 mm) zum niederschlagsreichen Sachsen (weit über 600 mm) ist. Die Leina selbst gehört schon zum feuchteren Teil des Altenburger Kreises. Für die Leina speziell liegen Niederschlagswerte von 595 mm Jahresdurchschnitt vor. Als Jahresdurchschnittstemperatur wurde 8,6—8,7 °C ermittelt.

## Waldbestand

Laut Aufzeichnungen, die bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückgehen, geht hervor, daß in jener Zeit auf dem Gebiet der Leina ein massiver Laubholzhochwald stand (besonders Buchen, Eichen, Tannen). Später wurde dieser zum Mittelwald umgewandelt, und 1837 gab es nur noch 36 ha Hochwald und 1,854 ha Mittelwald. Diese Bestände hatten sich jedoch sehr verschlechtert, so daß man 1838 eine Verordnung herausgab, um eine neue Umwandlung vorzunehmen. Dabei stieg besonders der Nadelwald an. Durch eine auftretende Holznot in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden große Kahlschläge, die jetzt besonders durch Fichten in reinen Beständen wieder aufgeforstet wurden. Die Fichte zeigte ungeheure Wuchsleistung und wurde 2—3mal aufgeforstet. Dadurch traten aber vorher unbekannte Schäden durch Insektenfraß und Windwurf auf, Ertrag und Boden verschlechterten sich stark. So sah man sich im Jahr 1928 gezwungen, erneut eine Veränderung der Waldbestände entsprechend der Bodenverhältnisse vorzunehmen. Es wurden ungleichaltrige Mischbestände aufgezogen. Es ist gelungen, den Fichtenbestand auf ein Mindestmaß zurückzudrängen. Heute werden Eichen, Buchen, Linden, Hainbuchen, Pappeln, z. T. Kiefern (Rauchschäden) und besonders Lärchen angebaut. Der Leinawald gehört zur Leitgesellschaft für Wuchsbezirk I (Ostthüringisch-Mittelsächsische Eichen-Hainbuchenwälder). Die verbreitetste Gesellschaftsgruppe ist die Pflanzengesellschaft Eichen-Hainbuchen-Wald. Aus früherem Waldbestand sind uns noch einige natürliche Standorte erhalten geblieben, die als Schonwaldung anerkannt sind. Wir finden sie in der Abteilung 59 mit einem Stieleichen-Hainbuchen- und Lindenbestand auf Lößboden und entlang des unteren Teichgrabens in Abteilungen 52, 53, 54 und 55 mit Erlen-Eichenbestand, Abt. 5. mit Auwald.



## Pilze

Wann die Pilzflora von der Leina erstmalig erforscht wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Die erste Veröffentlichung war in der Pilzflora um Altenburg, 1919 (I) und die zweite, 1934 (II) von einem Kollektiv SCHWEFFINGER-HEYNE-PFAU. Hinzu kommen aus dem MAX-JUNG-Pilzarchiv (Ju) viele weitere Arten, soweit ich sie ermittelt habe. Mit größter Vorliebe hat sich der hochverdiente MAX JUNG mit Täublingen beschäftigt. Auch die Notizen von SEIFFERT (Sei) und von K. BESSER (Be) gaben mir viele Hinweise, ebenso aus eigener Altenburger Pilzfundkartei.

Nach meiner Beurteilung ist diese Pilzflora sehr artenreich und müßte noch mehr durchforstet werden. Hoffentlich bleibt der Pilzreichtum bestehen, da die Leina sehr von „Pilzsammelwütigen“ aufgesucht wird. [Vor allem sei jeder vor den gefährlichen Giftpilzen gewarnt, die dort auftreten.]

Ich bitte alle Pilzfreunde und -sammler um Fundortangaben von seltenen Arten bzw. um Mitteilung von Neufunden und um Zusendung unbekannter zu bestimmender Species.]

### Begleitpflanzen (Gehölze)

1. <i>Abies alba</i> MILL.	s (angepflanzt)
2. <i>Acer campestre</i> L.	s
3. <i>Acer platanoides</i> L.	s (auch angepflanzt)
4. <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	z (auch angepflanzt, z. T. Bestände)
5. <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	vereinzelt
6. <i>Alnus glutinosa</i> GAERTN.	z (auch angepflanzt)
7. <i>Betula pendula</i> ROTH	g (Bestände)
8. <i>Betula pubescens</i> EHRH.	s
9. <i>Carpinus betulus</i> L.	g (Bestände)
10. <i>Cornus sanguinea</i> L.	s
11. <i>Corylus avellana</i> L.	s
12. <i>Crataegus monogyna</i> JACQ.	s
13. <i>Crataegus oxyacantha</i> L.	s
14. <i>Euonymus europaeus</i> L.	s
15. <i>Fagus sylvatica</i> L.	g (Bestände, auch angepflanzt)
16. <i>Fraxinus excelsior</i> L.	z (auch angepflanzt)
17. <i>Hedera helix</i> L.	z
18. <i>Larix decidua</i> MILL.	v (Bestände, angepflanzt)
19. <i>Larix leptolepis</i> GORD.	z (Bestände, angepflanzt)
20. <i>Ligustrum vulgare</i> L.	s
21. <i>Lonicera xylosteum</i> L.	s
22. <i>Malus sylvestris</i> MILL.	s (verwildert)
23. <i>Picea abies</i> KARST.	g (Bestände, angepflanzt)

24. <i>Picea omorika</i> PURK.	s	(angepflanzt)
25. <i>Picea sitchensis</i> CARR.	s	(angepflanzt)
26. <i>Pinus nigra</i> ARN.	s	(angepflanzt)
27. <i>Pinus strobus</i> L.	z	(Bestände, angepflanzt)
28. <i>Pinus sylvestris</i> L.	v	(Bestände, angepflanzt)
29. <i>Populus berolinensis</i> DIPP.		(angepflanzt)
30. <i>Populus canadensis</i> MOENCH	z	(angepflanzt)
31. <i>Populus nigra</i> L.	s	(angepflanzt)
32. <i>Populus robusta</i> SCHN.		(angepflanzt)
33. <i>Populus tremula</i> L.	z	
34. <i>Populus trichocarpa</i> T. et GR.		(angepflanzt)
35. <i>Prunus avium</i> L.	s	
36. <i>Prunus padus</i> L.	z	
37. <i>Prunus serotina</i> EHRH.	s	(angepflanzt)
38. <i>Prunus spinosa</i> L.	s	
39. <i>Pseudotsuga menziesii</i> FRANCO	s	(angepflanzt)
40. <i>Pyrus achras</i> GAERTN.	s	(verwildert)
41. <i>Quercus petraea</i> LIEBL.	z	
42. <i>Quercus robur</i> L.	g	(Bestände, angepflanzt)
43. <i>Quercus rubra</i> L.	v	(Bestände, angepflanzt)
44. <i>Rhamnus frangula</i> L.	z	
45. <i>Ribes sylvestre</i> MERT. et KOCH	s	(verwildert)
46. <i>Ribes uva-crispa</i> L.	z	(verwildert)
47. <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	s	
48. <i>Rosa canina</i> L.	s	
49. <i>Rubus caesius</i> L.	z	
50. <i>Rubus fruticosus</i> L.	v	
51. <i>Rubus idaeus</i> L.	v	
52. <i>Salix alba</i> L.		vereinzelt
53. <i>Salix caprea</i> L.	z	
54. <i>Sambucus nigra</i> L.	v	
55. <i>Sambucus racemosa</i> L.	s	
56. <i>Sorbus aucuparia</i> L.	z	
57. <i>Symphoricarpos albus</i> BLAKE		
<i>var. laevigatus</i> BLAKE	s	
58. <i>Tilia cordata</i> MILL.	v	(Bestände, auch angepflanzt)
59. <i>Tilia platyphyllos</i> SCOP.	z	
60. <i>Ulmus carpinifolia</i> GLED.	s	(auch angepflanzt)
61. <i>Ulmus glabra</i> HUDS.	s	
62. <i>Viburnum opulus</i> L.	s	
63. <i>Vinca minor</i> L.	v	

### Fund- und Standortnachweis

Klasse: *Basidiomycetes*, Ständerpilze

Unterklasse: *Gasteromycetidae*, Innensporer

Ordnung: *Sclerodermatales*, Hartbovistartige

Familie: *Sclerodermataceae*, Hartboviste

Gattung: *Scleroderma*, Kartoffelbovist

1. *S. aurantium* VAILL., Dickschaliger K.  
Mo- 106, MH-I/183 Gi!  
I, an Waldwegen; 16. 9. 68.
2. *S. verrucosum* VAILL., Dünnschaliger K.  
Mo- 107, MH-II/177. Gi!  
Ende September 62 (Ju); 1. 9. 63 an Waldwegen; 8. 11. 64.

Familie: *Astraeaceae*, Wettersterne

Gattung: *Astraeus*, Wetterstern

3. *A. hygrometricus* MORG.  
Mo- 104, MH-I/184 U  
11. 9. 49 auf Fichtennadelboden, gesellig (Ju).

Ordnung: *Rhizopogonales*, Wurzeltrüffelartige

Familie: *Rhizopogonaceae*, Wurzeltrüffel

Gattung: *Rhizopogon*, Wurzeltrüffel

4. *R. virens* (FR.) em. RL., Braune W.  
Mo- 94 jE  
Ende August 31 im Kiefernwald.

Ordnung: *Nidulariales*, Nestpilzartige

Familie: *Nidulariaceae*, Nestpilze

Gattung: *Crucibulum*, Tiegelteuerling

5. *C. laeve* KAMBLY, Gemeiner T.  
Mo- 111, MH-II/178 Nvb  
Juli 32 auf Nadelholz- und Laubholzmulm.

Gattung: *Cyathus*, Teuerling

6. *C. olla* PERS., Bleigrauer T.  
Mo- 119, MH-II/(179) Nvb  
I, meist auf dem Erdboden
7. *C. striatus* WILLD., Gestreifter T.  
Mo- 129; MH-II/179 Nvb  
I, an Holzresten; 1. 9. 63; 30. 9. 64.

Ordnung: *Lycoperdales*, Staubpilzartige

Familie: *Lycoperdaceae*, Staubpilze

Gattung: *Bovista*, Bovist

8. *B. nigrescens* PERS., Eier-B.  
Mo- 155, MH-II/186 jE  
Spätsommer 67 und 68 an grasigen Waldwegen.

Gattung: *Calvatia*, Becherstäubling

9. *C. caelata* MORG., Hasenbovist  
Mo- 125, MH-II/144 jE  
I, auf Weiden, vereinzelt.
10. *C. saccata* MORG., Beutelbovist  
Mo- 127, MH-II/146 JE  
5. 9. 30 im Lw (Ju); 23. 9. 32 (Ju).

- 10a. *C. saccata* var. *pistilliformis* HOLL.  
Mo- (127) jE  
11. 8. 60 Lw, auf fettem Boden (Ju); 1. 9. 63.

Gattung: *Lycoperdon*, Stäubling

11. *L. aestivale* BON., Sommer-S.  
Ri. 1811  
9. 10. 33 auf moos.-gras. Boden (Ju).
12. *L. depressum* BON., Niedergedrückter S.  
Mo- 149, MH-II/148 jE  
September 62 an Wegen (Ju).
13. *L. echinatum* PERS., Igel-S.  
Mo- 134, MH-II/152 jE  
3. 10. 62 im Lw (Ju).
14. *L. perlatum* PERS., Flaschen-S.  
Mo- 139, MH-I/185 jE  
I, im Wald und auf Weiden; 14. 9. 35 Lw (Ju); 12. 10. 62; 1. 9. 63.
15. *L. pyriforme* SCHFF., Birnen-S.  
Mo- 144, MH-II/149 U  
I, an modrigen Stu.; 28. 8. 30 Mw (Ju); 12. 10. 62; 1. 9. 63; 30. 9. 64.
16. *L. umbrinum* PERS., Bräunlicher S.  
Mo- 140, MH-II/153 jE  
14. 9. 35 Lw (Ju); 17. 10. 43 Nadelboden (Ju); 1. 9. 63.

Ordnung: *Geastrales*, Sternpilzartige

Familie: *Geastraceae*, Sternpilze

Gattung: *Geastrum*, Erdstern

17. *G. nanum* PERS., Kleiner E.  
18. Mo- 168, MH-II/162,3 oS  
7. 8. 30 auf Fichtennadeln (Ju).
18. *G. quadrifidum* PERS., Kronen-E.  
Mo- 161, MH-II/168,9 oS  
II, im Nw; 16. 10. 33 Nw (Ju).

Ordnung: *Phallales*, Rutenpilzartige

Familie: *Phallaceae*, Rutenpilze

Gattung: *Phallus*, Stinkmorchel

19. *P. impudicus* PERS., Gemeine S.  
Mo- 182, MH-I/188 jE (als Hexenei, ohne Haut), später U  
I, in lichten Wä.; 21. 7. 30 Lw (Ju); 12. 10. 62; 1. 9. 63.

Gattung: *Mutinus*, Hundsrute

20. *M. caninus* FR., Gemeine H.  
Mo- 179, MH-II/141 U  
I, am Grunde der Lh-Stämme; 23. 8. 32 Buchenwald, nahe an Baum-Stu,  
nach Gewitterregen bei vorheriger Trockenheit (Ju); 2. 8. 42 (Ju).

Familie: *Hysterangiaceae*, Schwanztrüffel

Gattung: *Hysterangium*, Schwanztrüffel

21. *H. clathroides* VITT., Gelbe S.  
Mo- 25, MH-II/189 U  
I, in lichten Wäldern, selten.

Unterklasse: *Hymenomycetidae*, Außensporer

Ordnung: *Russulales*, Täublingsartige

Familie: *Russulaceae*, Sprödblätterpilze

Gattung: *Lactarius*, Milchling

22. *L. aurantiacus* Fr., Orangeroter M.  
Mo. 2532 U  
10. 10. 40 Fichtenwald (Ju).
23. *L. blennius* Fr., Grasgrüner M.  
Mo. 2503, MH-V/30a V  
I, Lw; 19. 9. 49 (Ju); 1. 9. 63; 1. 8. 66 unter Buchen; 14. 9. 69.
24. *L. camphoratus* Fr., Kampfer-M.  
Mo. 2537, MH-V/43 Wü  
9. 8. 40 Mw auf moos. Grund (Ju); 7. 7. 41 am Straßengraben zw. Moos und Nadeln (Ju); 22. 7. 41 Mw (Ju).
25. *L. chrysorrheus* Fr., Goldflüssiger M.  
Mo. 2496, MH-V/12 Gi!  
II, Lw bei Klausau; 29. 9. 35 Lw (Ju); 7. 10. 40 Mw; 26. 8. 51 Mw und Lw (Ju).
26. *L. cilicioides* Fr., Fransen-M.  
Mo. 2475, MH-V/6 V  
14. 10. 58 Nw (Ju).
27. *L. cyathula* Fr., Erlen-M.  
Mo. 2545 Wü  
4. 10. 32 Mw, auf Grasboden (Ju); 10. 10. 33 im Gras (Ju).
28. *L. deliciosus* S. F. GRAY, Edel-Reizker  
Mo. 2490, MH-I/111, MH-V/21 E  
I, bes. in Fichtengebüschen; 26. 8. 30 unter Birken.
29. *L. flexuosus* Fr., Verbogener M.  
Mo. 2517, MH-V/36 U  
I, an gras. Stellen im Nw.; 29. 5. 35 Lw; 26. 8. 51 Mw und Lw; 28. 6. 52 gras. Fichtenwaldrand (Ju); 3. 7. 63 Nw, Grasrand (Ju).
30. *L. glyciosmus* Fr., Blasser oder Kleiner Duft-M.  
Mo. 2523, MH-V/41 Mü  
II, Fichtengebüsche, gesellig; 1. 9. 40 Lw und Fichtenwald (Ju) 11. 8. 40 im Grase, zw. Schneisen, nach Regenfällen hfg. (Ju); 8. 11. 64; 24. 10. 64 Nw; 14. 9. 69.
31. *L. helvus* Fr., Bruch-Reizker  
Mo. 2518, MH-I/115, MH-V/42 Gi! (Wü)  
I, Nw, an bestimmten Stellen massenhaft; 28. 8. 30 Mw (Ju); 13. 8. 40; 14. 9. 69 Nw; 26. 9. 70.
32. *L. ichoratus* BATSCH, Orangebrauner M.  
Mo. 2530, MH-V/46 V  
2. 10. 62 Lw; 14. 9. 69.
33. *L. lilacinus* Fr., Lila-M.  
Mo. 2521, MH-V/44 E  
14. 11. 34 Mw und Lw (Ju); 30. 9. 55 Lw (Ju).
34. *L. mammosus* Fr., Dunkler Duft-M.

- Mo. 2524, MH-V/40 E  
2. 10. 62 Nw; 12. 10. 62; 24. 10. 64.
35. *L. mitissimus* FR., Milder M.  
Mo. 2531, MH-V/47 Egw  
16. 8. 41 Mw, auf laubig-moosigem Boden (Ju); 6. 7. 63.
36. *L. necator* KARST., Olivbrauner M.  
Mo. 2479, MH-V/29 U  
I, Nw; 19. 9. 32 Nw (Ju); 29. 9. 35 Fichtenwald (Ju); 8. 10. 54 (Ju); 12. 10. 62;  
30. 9. 63 Nw; 14. 9. 69.
37. *L. obnubilus* LASCH, Süßer M.  
Ri. 1271  
2. 10. 39 Mw (Ju).
38. *L. pallidus* PERS., Fleischblasser M.  
Mo. 2507, MH-V/26 U  
14. 9. 69 Lw.
39. *L. piperatus* S. F. GRAY, Echter Pfeffer-M.  
Mo. 2472, MH-V/2 E-nbZ  
I, Mw; 25. 7. 30 Mw; 20. 7. 49 Lw; 15. 7. 52 Lw; 15. 7. 53 Lw und Mw;  
21. 8. 62 (Ju); 30. 9. 64; 9. 8. 67 Lw, massenhaft.
40. *L. pubescens* FR., Flaumiger M.  
Mo. 2482, MH-V/7 Gi!  
14. 10. 58 Lw
41. *L. pyrogalus* BULL., Beißender M.  
Mo. 2516, MH-V/35 V  
I, Gebüsche; 14. 7. 40 Nw (Ju).
- 41a. *L. pyrogalus* var. *pyriodorus*  
September 27 im Mw.
42. *L. quietus* FR., Eichen-M.  
Mo. 2538, MH-V/38 E-nbZ  
21. 8. 30 Nw und Lw (Ju); 5. 8. 40 Mw (Ju); 21. 10. 62; 14. 9. 69 Lw.
43. *L. rufus* FR., Rotbrauner M.  
Mo. 2536, MH-I/113, MH-V/63 E-nbZ  
I, Nw, gesellig; Oktober 26 Nw (Ju); 22. 6. 49 unter Fichten (Ju); 18. 6. 52  
(Ju); 30. 9. 64; 14. 9. 69 unter Fichten.
44. *L. scrobiculatus* FR., Grubiger M.  
Mo. 2476, MH-V/11 Gi!  
I, bes. im Nw.
45. *L. seriftus* DC., Wässriger M.  
Mo. 2540, MH-V/50 U  
II, an feuchten Waldstellen, bei Niederhain; 12. 10. 62 Lw.
46. *L. subdulcis* BULL., Süßlicher M.  
Mo. 2539, MH-V/39 E  
I, Gebüsche; 14. 7. 40 (Ju); 12. 9. 55 Lw (Ju).
47. *L. thejogalus* FR., Flatter-Reizker  
Mo. 2534, MH-V/52 U  
3. 9. 37 Lw im Gras (Ju); 26. 8. 50 Lw (Ju); 30. 9. 55 Mw (Ju).
48. *L. torminosus* GRAY, Birken-Reizker  
Mo. 2481, MH-I/112, MH-V/5 U E-nbZ

2. 9. 30 unter Birken (Ju); 30. 9. 35 im Gras (Ju); 12. 8. 40 grasiger Lw (Birke, Buche) (Ju); Juli 71.
49. *L. umbrinus* FR., Umbrabrauner M.  
Mo- 1938, MH-V/37 U  
10. 10. 52 Buchenwald, auf Laubboden (Ju).
50. *L. vellereus* FR., Wolliger M.  
Mo. 2471, MH-I/116, MH-V/3 U  
I, bes. im Buchenwald; 12. 10. 62; 24. 10. 64 Lw.
51. *L. L. vietus* FR., Graufleckender M.  
Mo. 2514, MH-V/31 V  
II, im untermischten Nw.
52. *L. volemus* FR., Milchbrätling  
Mo. 2525, MH-I/114, MH-V/54 E  
I, Wälder, einzeln; 18. 9. 38 Mw (Ju); 20. 8. 40 Mw (Ju); 16. 8. 50 Mw (Linden, Buchen) (Ju); 18. 8. 59 Lw (Ju).
- Gattung: *Russula*, Täubling
53. *R. adulterina* FR., Scharfer Braun-T.  
Mo. 2465, MH-V/151 U  
16. 9. 49 Nw (Ju).
54. *R. adusta* FR., Rauchbrauner Schwarz-T.  
Mo. 2362, MH-V/72 Egw  
I, Wälder; 21. 9. 49 Lw mit Kiefern (Ju); 8. 8. 50 Mw (Ju); 8. 11. 54 (Ju); 3. 7. 64 Mw (Ju); 3. 10. 69 Nw.
55. *R. aeruginea* LINDBL., Grasgrüner T.  
Mo. 2387, MH-I/117, MH-V/85 E-rgi!  
2. 10. 62 Nw und Lw; 6. 7. 63 unter Birken; 1. 9. 63 Lw.
56. *R. alutacea* FR., Weißstieliger Leder-T.  
Mo. 2409, MH-V/114 E  
14. 7. 53 Nw (Ju); 25. 9. 56 Lw und Mw (Ju); 9. 8. 67 Lw; 14. 9. 69.
57. *R. amoena* QUEL., Brätlings-T.  
Mo. 2393, MH-V/93 E  
12. 9. 32 Lw (Ju); 21. 8. 62 (Ju); 10. 7. 63 Lw (Ju); 24. 10. 64.
58. *R. atropurpurea* KRBE., Purpurschwarzer T.  
Mo. 2435, MH-I/128, MH-V/133 Egw  
August 25 Mw (Ju); 14. 10. 58 Nw (Ju); 13. 8. 62; 2. 10. 62, 3. 11. 65; 14. 9. 69 Lw.
59. *R. aurata* WITH., Gold-T.  
Mo. 2413, MH-V/117 jE  
Lw, bei Klausen, selten (oB).
60. *R. azurea* BRES., Violetter Reif-T.  
Mo. 2395, MH-V/96 E  
3. 8. 51 Lw (Ju).
61. *R. badia* QUEL., Zederholz-T.  
Mo. 2466, MH-V/157 U  
August 33 Nw (Ju); 20. 9. 49 Mw (Ju); 2. 10. 62 Mw (Ju).
- 61a. *R. badia f. griseipes*  
1. 9. 33 Nw (Ju).
62. *R. blackfordiae* PECK, Scharfer Wachs-T.

- Mo. 2450, MH-V/148 U  
Anfang August 25 (Ju); Sommer 26 Lw.
63. *R. brunneoviolacea* CRAWSH., Violetter Samt-T.  
Mo. 2424, MH-V/95 E  
August 29 Lw (Ju); 11. 8. 51 Nw (Ju); 7. 9. 62 Lw (Ju); Juli 63.
64. *R. chamaeleontina* FR., Chamäleon-T.  
Mo. 2420, MH-V/124 Egw  
4. 9. 35 Lw (Ju); 6. 7. 63 Nw, hfg.
65. *R. coerulea* FR., Buckel-T.  
Mo. 2405, MH-V/110 E  
2. 10. 62 Nw (Kiefer).
66. *R. consobrina* FR., Rußgrauer T.  
Mo. 2363, MH-V/74 U  
6. 7. 43 Lw (Ju).
67. *R. cyanoxantha* SCHEFF., Frauen-T.  
Mo. 2386, MH-I/119, MH-V/92 E  
I, Lw; 1. 8. 25; Juli 30 (Ju); 13. 8. 62; 6. 7. 63; 9. 8. 67 unter Buchen;  
14. 9. 69.
68. *R. decolorans* FR., Orangeroter Graustiel-T.  
Mo. 2365, MH-I/122, MH-V/105 E  
11. 8. 51 Mw (Ju); Anfang September Nw (Ju).
69. *R. delica* FR., Blaublättriger Weiß-T.  
Mo. 2358, MH-V/67 Us Egw  
II, Lw und Nw; Anfang September 26 Lw; 28. 8. 41 (Ju); 9. 8. 67 Lw.
70. *R. emetica* FR., Kirschroter Spei-T.  
Mo. 2439, MH-V/138 U  
I, Lw, bes. an feuchten Stellen; 17. 7. 30 Lw (Buche, Eiche), Grasboden,  
hellrote Form (det. Schäffer) (Ju); 7. 10. 40 Mw (Ju); 2. 10. 62; 30. 9. 64;  
14. 9. 69.
- 70a. *R. emetica* var. *gragaria*  
August 40, Nw, auf moosigem Grund (Ju).
71. *R. jellea* FR., Gallen-T.  
Mo. 2380, MH-V/80 U  
II, mit Vorliebe im Buchenwald, selten; August 25 (Ju); 5. 7. 43 Mw (Ju);  
11. 9. 49 Lw (Ju).
72. *R. flava* ROM., Gelber Graustiel-T.  
Mo. 2364, MH-I/121, MH-V/104 E  
30. 6. 29 Lw, bes. unter Birken, gras. Boden (Ju).
73. *R. foetens* FR., Stink-T.  
Mo. 2375, MH-V/78 U  
I, an lichten Waldstellen; Juli 26 Mw (Ju); 26. 7. 30 Lw (Ju); 14. 9. 69 unter  
Eichen.
74. *R. fragilis* FR., Wechselfarbiger Spei-T.  
Mo. 2444, MH-V/142 U  
I, meist an morschen Stu.; August 26 Nw (Ju); 18. 8. 52 Lw (Ju); 2. 10. 62 M w.
- 74a. *R. fragilis* f. *violaceus*  
August/September 26 (Ju).
75. *R. furcata* FR., Grüner Speise-T.

- Mo. 2384, MH-V/90 E  
I, Lw und Nw; August 28 Mw (Ju); 21. 7. 43 Lw (Buche, Birke, Eiche) (Ju);  
21. 8. 62 Lw (Ju).
76. *R. integra* L., Brauner Leder-T.  
Mo. 2411, MH-I/131, MH-V/116 E  
5. 8. 30 Nw (Ju); 5. 10. 51 unter Kiefern, gras. Lichtung (Ju).
77. *R. linnaei* FR., Anlaufender T.  
Ri. 1304 E  
II, Nw und Lw, bei Klausen.
78. *R. lutea* HUDS., Weicher Dotter-T.  
Mo. 2419, MH-V/121 E  
28. 6. 52 Lw (Ju); 30. 7. 62 Lw, auf Laubboden (Ju); 14. 9. 69.
79. *R. mellolens* QUEL., Honig-T.  
Mo. 2431, MH-V/130 E  
7. 9. 62 Lw (Ju).
80. *R. nauseosa* FR., Ekel-T.  
Mo. 2421, MH-V/123 U  
August 29 Lw (Ju).
81. *R. nigricans* FR., Dickblättriger Kohlen-T.  
Mo. 2359, MH-V/69 jEgw Ne  
I, in Wäldern; August 38 Mw (Ju); 22. 8. 57 Mw (Ju); 2. 10. 62; 6. 7. 63 hfg.;  
1. 9. 63; 4. 8. 67 Lw (Buche, Hainbuche); 14. 9. 69.
82. *R. nitida* FR., Glänzender T.  
Mo. 2425, MH-V/126 E  
13. 8. 51 Lw, Sporen hell, selten nur zweimal gefunden (Ju).
83. *R. obscura* ROM., Weinroter T.  
Mo. 2366, MH-V/106 E  
August 25 Nw (Ju); September 27 (Ju); August 30 Mw (Ju); September 32  
(Ju); Juli 63 unter Kiefern.
84. *R. ochracea* FR. ss Ri. non SCHUM., Ockergelber T.  
Ri. 1293 E  
I, Nw; 17. 9. 49 im Wald, gras. Boden, mild (Ju).
85. *R. ochroleuca* FR., Gelbweißer T.  
Mo. 2381, MH-I/120, MH-V/82 E-nbZ  
II, bes. im Nw; Ende August 34 Nw (Ju); 19. 9. 52 Nw (Ju); 13. 8. 62;  
2. 10. 62; 1. 9. 63; 20. 9. 64 Nw und Lw.
86. *R. olivacea* FR., Rotstieliger Leder-T.  
Mo. 2408, MH-I/130, MH-V/113 E  
August 25 Nw und Lw (Ju); 31. 7. 50 Mw mit Buchen (Ju); 6. 8. 52 Mw  
(Buche, Linde, Fichte) (Ju).
87. *R. paludosa* BRITZ., Apfel-T.  
Mo. 2433, MH-V/127 E  
August 22 Mw (Ju); 14. 9. 69 unter Kiefern.
88. *R. palumbina* QUEL., Graugrüner T.  
Mo. 2391, MH-V/86 E  
Juli 29 Lw (Ju); 12. 11. 37 Mw (Ju).
89. *R. pectinata* FR., Kratzender Kamm-T.

- Mo. 2370, MH-V/75 U  
13. 11. 34 (Ju); 13. 8. 62 Mw; 19.63 Lw.
90. *R. pseudointegra* ARN. et GOR., Ockerblättriger Zinnober-T.  
Mo. 2404, MH-V/108 U  
9. 9. 50 Mw mit Buchen und Eichen (Ju); 31. 8. 51 Lw und Mw (Ju); 16. 8. 52  
im Gras auf Schneisen (Ju); 14. 7. 53 Mw (Ju); 23. 7. 56.
91. *R. puellaris* FR., Milder Wachs-T.  
Mo. 2427, MH-V/125 E  
7. 8. 51 Mw (Ju); 11. 8. 51 Nw (Ju); 25. 6. 52 unter Fichten (Ju); 14. 9. 69 Nw.
92. *R. queletii* FR., Stachelbeer-T.  
Mo. 2460, MH-I/126, MH-V/153 U  
28. 10. 32 Nw; 20. 10. 33 unter Fichten (Ju); 12. 10. 52 Nw (Ju).
93. *R. rosacea* PERS., Harter Zinnober-T.  
Mo. 2396, MH-V/101 Ne  
I, bes. im Lw; September 27 Mw (Ju); 31. 8. 51 Mw (Ju); 17. 8. 52 Mw (Ju);  
2. 10. 62; 1. 9. 63; 14. 9. 69.
94. *R. rosea* QUEL., Rosen-T.  
Mo. 2398, MH-V/102 E  
22. 8. 61 Lw (Ju).
95. *R. roseipes* SECR. ss. BRES., Rosastieliger Orange-T.  
Mo. 2418, MH-V/122 E  
II, Nw und Lw.
96. *R. rubra* KRBH., Weißstieliger T.  
Mo. 2455, MH-V/140 U  
I, im Lw.
97. *R. sanguinea* FR., Blutroter T.  
Mo. 2454, MH-V/149 U  
28. 10. 32 Nw (Ju).
98. *R. sardonica* FR., Zitronenblättriger T.  
Mo. 2458, MH-V/154 U  
II, Nw, scharenweise; 2. 10. 60 Nw (Ju); 2. 10. 62; Oktober 63 unter Kiefern  
(Ju); 24. 10. 64.
99. *R. velenovskyi* MELZ. et Zv., Ziegelroter T.  
Mo. 2434, MH-V/128 E  
28. 7. 44 Lw (Buchen, Eichen), gras. Boden (Ju).
100. *R. vesca* FR., Speise-T.  
Mo. 2385, MH-I/123, MH-V/91 E  
I, Lw und Nw, an Waldwegen; August 26 (Ju); 8. 7. 39 unter Buchen (Ju);  
14. 10. 43 (Ju); 13. 8. 62; 6. 7. 63; 14. 9. 69 Lw und Nw.
101. *R. violacea* QUEL., Violetter T.  
Mo. 2447, MH-V/143 U  
12. 10. 62 Mw.
102. *R. virescens* FR., Gefelderter Grün-T.  
Mo. 2382, MH-I/118, MH-V/84 E  
I, Lw, bes. unter Birken und Buchen; 1. 8. 26 Mw (Ju); August 29 Lw (Ju);  
10. 8. 51 Lw (Ju); 14. 9. 69.
103. *R. viscida* KUDR., Lederstiel-T.  
Mo. 2432, MH-V/129 E

14. 9. 49 unter Fichten, violette Form (Ju); 29. 6. 52 Nw und Lw (mit Fichten) (Ju).
104. *R. xerampelina* FR., Herings-T.  
Mo. 2403, MH-I/129, MH-V/107 E  
August 25 Nw (Ju); 25. 7. 30 Mw (Ju).
- 104a. *R. xerampelina* var. *olivascens*  
August 26 Lw (Ju).
- 104b. *R. xerampelinae* var. *rubra* BRITZ.  
Sommer 34 Nw.
- Ordnung: *Boletales*, Röhrenpilzartige  
Familie: *Strobilomycetaceae*, Dunkelröhrenpilze  
Gattung: *Porphyrellus*, Porphyrröhrling
105. *P. pseudoscaber* SING., Düstere Röhrling  
Mo. 2, MH-II/8 Ne  
August 29 Mw und Nw (Ju); 16. 9. 33 Mw (Ju); 22. 9. 44 Nw mit Birken (Ju).  
Gattung: *Strobilomyces*, Strubbelkopfröhrling
106. *S. floccopus* KARST., Strubbelkopf  
Mo. 1, MH-I/164 Ne  
von SEIFFERT bestätigt, sehr selten (oB); 30. 7. 50 Lw unter Buchen (Ju).
- Familie: *Boletaceae*, Röhrenpilze  
Gattung: *Boletus*, Dickröhrling
107. *B. aereus* BULL., Weißer Bronze-Röhrling  
Mo. 55, MH-I/155 E  
I, an lichten Waldplätzen; 1. 8. 49 Straßengraben am Waldrand (Ju);  
25. 6. 52 Lw (Ju).
108. *B. aestivalis* PAUL., Sommer-Steinpilz  
Mo. 58, MH-I/154 E  
20. 5. 30 Lw (Ju); 16. 8. 51 Lw unter Eichen, auf fettem Boden (Ju); 18. 7. 61  
lichter Lw (Eichen, Buchen), hohes Gras (Ju); 6. 7. 63; 1. 9. 63.
109. *B. appendiculatus* SCHEFF., Gelber Bronze-Rö.  
Mo. 54, MH-II/2 E  
23. 8. 33 Lw (Ju); 22. 6. 37 Lw (Ju); 14. 8. 63 Lw (Ju); 10. 8. 64 Lw.
110. *B. calopus* FR., Schönfuß-Rö.  
Mo. 50, MH-I/160 U  
I, Nw und Lw.
111. *B. edulis* BULL., Steinpilz  
Mo. 57, MH-I/153 E  
I, an lichten Waldstellen, Gebüsch und Nw-dickicht; August 29 Lw (Ju);  
20. 5. 30 Lw (Ju); 8. 7. 39 unter Buchen (Ju); 7. 8. 51 Lw (Ju); 4. 9. 58 (Ju);  
11. 7. 60 (Ju); 2. 10. 62; 12. 10. 62; 30. 9. 64; 14. 9. 69.
112. *B. erythropus* FR., Flockenstielliger Hexenpilz  
Mo. 40, MH-I/157 E-rgi!  
II, in Wäldern; 12. 6. 29 unter Buchen (Ju); 3. 7. 33 Lw (Ju); 21. 7. 62 (Ju);  
18. 8. 64 Lw (Ju); 9. 7. 68 Lmw.
113. *B. fragrans* VITT., Wohlriechender Rö.  
Mo. 49 E  
II, Lw, selten (nach MICHAELS Mitteilung).

114. *B. implitus* FR., Fahler Rö.  
Mo. 48, MH-I/156 E  
August 67 unter Buchen, selten.
115. *B. luridus* FR., Netzstieliger Hexenpilz  
Mo. 42, MH-I/158 E-rgi! Nab  
August 68 Lmw.
116. *B. pulverulentus* OPAT., Schwarzblauer Rö.  
Mo. 37, MH-II/17 Us  
23. 8. 29 Lw.
117. *B. queletii* SCHULZ., Glatstieliger Hexenpilz  
Mo. 41 E  
29. 8. 64 Lw.
118. *B. radicans* PERS., Wurzelnder Rö.  
Mo. 51, MH-II/4 U  
19. 9. 34 Lw (Ju); 7. 8. 51 Lw (Ju).  
Gattung: *Boletinus*, Hohlfußröhrling
119. *B. cavipes* KALCHBR.  
Mo. 7, MH-I/142 E  
28. 9. 52 Nw, gras. Waldweg; 21. 9. 53 (SEIFFERT); 13. 8. 57 Nw (Ju);  
August 58 Nw unter Lärchen (Ju).  
Gattung: *Gyroporus*, Blaßsporröhrling
120. *G. castaneus* QUEL., Hasen-Röhrling  
Mo. 3, MH-II/25 E  
I, sandiger Lw, am Schanzenholz; 7. 10. 51 Laubholzgebüsch am Waldrand (Ju).  
Gattung: *Leccinum*, Rauhfußröhrling
121. *L. aurantiacum* S. F. GRAY, Rotkappe  
Mo. 62, MH-I/163 E  
I, Gebüsch, gern unter Birken, an Waldwegen; 30. 6. 29 unter Birken (Ju);  
14. 9. 69 Lw.
122. *L. crocipodium* WATL., Gelber Birkenröhrling  
Mo. 60, MH-II/11 E  
August 29 (Ju); 9. 9. 64 im lichten Lw, selten.
123. *L. duriusculum* SING., Pappel-Röhrling  
Mo. 64, MH-II/12 E  
12. 8. 50 unter Zitterpappeln (Ju).
124. *L. griseum* SING., Hainbuchen-Röhrling  
Mo. 65, MH-II/13 E  
September 67 unter Hainbuchen, nördl. Teil.
125. *L. scabrum* S. F. GRAY, Birkenpilz  
Mo. 66, MH-I/162 jE  
I, bes. unter Birken; Sommer 52 (Ju); 12. 10. 62; 14. 9. 69 Lw.
126. *L. testaceo-scabrum* SING., Orangegelbe Rotkappe  
Mo. 63, MH-I/(163) E  
30. 6. 29 unter Birken (Ju).  
Gattung: *Suillus*, Schleimröhrling
127. *S. bovinus* O. KTZE., Kuhröhrling  
Mo. 20, MH-I/148 Egw  
I, im Nw; 21. 8. 62 im Mw.

128. *S. collinitus* O. KTZE., Ringloser Butterpilz  
Mo. 17, MH-I/(145) E  
Oktober 29 Nw (Kiefer) (Ju); September 35 Nw (Fichte, Kiefer, Lärche) (Ju).
129. *S. granulatus* O. KTZE., Körnchen-Röhrling  
Mo. 16, MH-I/146 E  
I, im Nw; 8. 11. 64.
130. *S. grevillei* SING., Gold-Röhrling  
Mo. 9, MH-I/146 E  
I, Nw, gern unter Lärchen und Kiefern; 17. 9. 34 im Gras (Ju); 6. 8. 52 unter Kiefern, sonniger Fleck (Ju); 12. 10. 62; 30. 9. 64; 19. 7. 65; 14. 9. 69 unter Lärchen.
131. *S. luteus* S. F. GEAY, Butterpilz  
Mo. 15, MH-I/145 E  
I, im Nw; 30. 9. 64; 14. 9. 69.
132. *S. piperatus* O. KTZE., Pfeffer-Röhrling  
Mo. 22, MH-I/161 UWü  
I, Nw, gesellig; August 30 feuchter moos. Nw (Ju); 13. 11. 34 (Ju); 22. 6. 49 moos. Fichtenwald (Ju); 5. 9. 52 Nw, feuchter moos. Boden (Ju); 27. 8. 63 Nw (Ju); 18. 8. 70.
133. *S. placidus* SING., Elfenbein-Röhrling  
Mo. 18, MH-II/20 E  
I, im Nw (Strobe), gesellig; von SEIFFERT oft bestätigt (1955).
134. *S. variegatus* O. KTZE., Sand-Röhrling  
Mo. 21, MH-I/147 jE  
I, sandiger Nw; 17. 9. 34 Nw (Ju).
- Gattung: *Phylloporus*, Goldblattröhrling
135. *P. rhodoxanthus* BRES., Goldblatt  
Mo. 23, MH-II/27 E  
22. 9. 62 Nw, am Gedenkstein.
- Gattung: *Tylopilus*, Rosasporröhrling.
136. *T. felleus* KARST., Gallenröhrling  
Mo. 59, MH-I/152 U  
I, bes. im Nw; September 26 Nw (Ju); 20. 7. 49 Nw (Ju); September 54 unter Fichten, hfg. (Ju); 18. 7. 61 Mw (Ju); 13. 8. 62; 9. 11. 63 (Ju).
- Gattung: *Xerocomus*, Filzröhrling
137. *X. badius* KÜHN., Maronenpilz  
Mo. 29, MH-I/151 E  
I, bes. im Nw; August 36 unter Fichten (Ju); 28. 10. 54 Nw (Ju); 12. 10. 62; 24. 10. 64; 14. 9. 69.
138. *X. chrysenron* QUEL., Rotfußröhrling  
Mo. 32, MH-I/149. jE  
I, an moos. Waldstrecken; 4. 12. 29 Mw (Ju); 25. 7. 30 Lw (Ju); 18. 9. 32 Mw (Ju); 7. 8. 51 Lw und Mw (Ju); 12. 10. 62; 6. 7. 63; 30. 9. 64; 9. 8. 67 Lw, Straßengraben; 14. 9. 69.
139. *X. rubellus* Mos., Blutroter Röhrling  
Mo. 26, MH-II/15 E  
I, Lw und Nw; 21. 7. 51 Lw-Gebüsch (Ju); 28. 7. 63 lichter Lw (Ju); 16. 6. 64 feuchter Wald, selten (Ju).

140. *X. subtomentosus* QUEL., Ziegenlippe  
Mo. 31, MH-I/150 jE  
I, Lw und Nw; 21. 7. 38 Nw (Ju); 28. 7. 44 Mw (Ju); 16. 8. 51 Fichtenwald  
(Ju); 12. 8. 52 (Ju); 14. 9. 69.

140a. *X. subtomentosus* f. *ferrugineus*  
24. 10. 64 Mw, rostfarbige Sonderform (Ju).

Familie: *Gomphidiaceae*, Gelbfußpilze

Gattung: *Chroogomphus*, Gelbfuß

141. *C. rutilus* O. K. MILLER, Kupferroter Schmierling  
Mo. 82, MH-I/137 E  
I, im Nw; 23. 8. 50 Nw; 4. 9. 63 Nw (Kiefer) (Ju).

Gattung: *Gomphidius*, Gelbfuß oder Schmierling

142. *G. glutinosus* FR., Großer Sch., Kuhmaul  
Mo. 79, MH-I/136 E  
I, am Nw-Rand; November 29 Nw (Ju); 7. 8. 51 Fichtenwald, liebt feuchten  
Boden und dunkles Dickicht (Ju).

143. *G. maculatus* FR., Fleckender Sch.  
Mo. 78 E  
I, nur unter Lärchen.

Familie: *Paxillaceae*, Krempepilze

Gattung: *Hygrophoropsis*, Gabelblättling oder Afterleistling

144. *H. aurantiaca* R. MRE., Falscher Pfifferling  
Mo. 75, MH-I/139 Ne  
I, bes. im Nw, in Holzschlägen; 14. 10. 34 Nw und Lw (Ju); 7. 10. 40 Lw  
(Ju); 1. 10. 50 Mw (Ju); 2. 10. 62; 6. 11. 63 Mw (Ju); 24. 10. 64; 14. 9. 69;  
26. 9. 71.

Gattung: *Paxillus*, Krempling

145. *P. atrotomentosus* FR., Samtfuß-K.  
Mo. 72, MH-I/141 Ne  
I, Nw, bes. an Stu.; 27. 9. 39 am Fuß der Fichte (Ju); 27. 9. 52 Nw (Ju);  
13. 8. 54 lichter gras. Fichtenwald (Ju); 13. 8. 62; 29. 10. 64 an Fichten-Stu.  
(Ju); 9. 8. 67 unter Fichten; 14. 9. 69.

145a. *P. atrotomentosus* forma, muschelartige Form  
29. 10. 64 an Fichten-Stu. (Ju).

146. *P. involutus* FR., Kahler K.  
Mo. 70, MH-I/140 E-rgi! Besser zu meiden!  
I, überall, hfg.; 11. 10. 33 (Ju); 2. 10. 62; 1. 9. 63; 3. 9. 64 sehr hfg.; 8. 11. 64;  
14. 9. 69 Nw und Lw.

147. *P. panuoides* FR., Muschel-K.  
Mo. 73, MH-III/290 Ne  
I, an Nh; 24. 10. 52 an Baum-Stu. (Ju); 17. 7. 55 an Nh-Stu. (Ju).

Ordnung: *Agaricales*, Edelpilzartige

A. Hellsporige Gruppe

Familie: *Hygrophoraceae*, Wachsblätterpilze

Gattung: *Camarophyllus*, Ellerling

148. *C. niveus* KARST., Schneeweißer E.

- Mo. 153, MH-III/258 E  
 Oktober 63 Lw, gras. Wegränder.
- Gattung: *Hygrocybe*, Saftling
149. *H. amoena* HALL. et METR., Schöner S.  
 Ri. 1325, MH-III/265 E  
 Lw-Gebüsch, von SEIFFERT bestätigt (oB).
150. *H. ceracea* KARST., Gebrechlicher S.  
 Mo. 176 oS  
 I, gras.-moosige Plätze (Leinawiese); von JUNG bestätigt (oB).
151. *H. coccinea* KUMM., Kirschroter S.  
 Mo. 204, MH-III/278 Us  
 6. 10. 31 im Gras, am Wilchwitzer Weg (Ju).
152. *H. miniata* KUMM., Mennigroter S.  
 Mo. 210, MH-III/276 Us  
 17. 9. 41 auf Grasboden (Ju).
153. *H. punicea* KUMM., Granatroter S.  
 Mo. 197, MH-I/132 E  
 10. 10. 33 am Wilchwitzer Feldweg im Gras (Ju).
- Gattung: *Hygrophorus*, Schneckling
154. Mo. 143, MH-III/242 E  
 24. 10. 64 Nw.
155. *H. aureus* FR., Goldgelber S.  
 Mo. 136 E  
 Oktober 30 Kiefernwald, auf moos. Boden (Ju).
156. *H. discoideus* FR., Braunscheibiger S.  
 Mo. 134, MH-III/247 E  
 Oktober 64 Nw, nördl. Teil.
157. *H. eburneus* FR., Elfenbein-S.  
 Mo. 120, MH-III/243 E  
 I, im Lw; 2. 10. 64.
158. *H. fuscoalbus* FR., Weißgestiefelter S.  
 Mo. 142 E  
 12. 10. 62 Nw (Kiefer).
159. *H. hypothejus* FR., Frost-S.  
 Mo. 135, MH-I/135 E  
 November 29 (Ju); 12. 10. 62 Nw.
160. *H. lucorum* KALCHBR., Lärchen-S.  
 Mo. 137, MH-III/239 E  
 24. 10. 64 unter Lärchen.
161. *H. nemoreus* FR., Wald-S.  
 Mo. 132, MH-III/256 E  
 I, im Lw; August 29 Mw (Ju); 15. 9. 41 Mw (Ju); 18. 8. 59 Mw, truppweise (Ju).
162. *H. olivaceoalbus* FR., Olivgestiefelter S.  
 Mo. 139, MH-III/238 E  
 12. 10. 62 Lw, Nw und Mw, dünnere und dickere Formen (Ju).
163. *H. pustulatus* FR., Schwarzpunktierter S.  
 Mo. 144, MH-III/241 E  
 Oktober 39 Nw (Ju).

164. *H. russula* QUEL., Purpur-S.  
Mo. 127, MH-I/134 E  
Mitte September 60 Lw (Ju).  
Familie: *Tricholomataceae*, Ritterpilze  
Gattung: *Armillariella*, Hallimasch
165. *A. mellea* KARST., Gemeiner H.  
Mo. 478, MH-I/97 E-rgi!  
I, überall; 30. 9. 31 (Ju); 2. 10. 62; 24. 10. 64; 14. 9. 69.
166. *A. tabescens* SING., Ringloser H.  
Mo. 479, MH-I/(97) E  
30. 9. 60 an Nh- und Lh-Stu., nördl. Teil.  
Gattung: *Calocybe*, Schönkopf
167. *C. constricta* KÜHN., Gegürtelter S.  
Mo. 452 Us?  
30. 8. 63 Lw. gras. Stellen.
168. *C. gambosa* DONK, Maipilz  
Mo. 451. MH-I/79 E  
I, Wald- und gras. Straßenränder; 3. 5. 66 gras. Stellen; 67 und 68.
169. *C. ionides* KÜHN., Veilchenblauer S.  
Mo. 459, MH-III/228 Us  
6. 7. 56 Lw, auf humosem Boden (Ju).
170. *C. persicolor* SING., Rosenroter S.  
Mo. 461, MH-III/226 Us?  
19. 6. 49 Mw, am Waldweg (Ju).  
Gattung: *Cantharellula*, Bechertrichterling
171. *C. umbonata* SING., Schildförmiger B.  
Mo. 493, MH-III/194 E  
vor 1938 im Moos an einer Schneise mit Buschwerk (oB.).  
Gattung: *Clitocybe*, Trichterling
172. *C. angustissima* KUMM., Schmalblättriger T.  
Mo. 298  
19. 8. 65 Mw, NW-Ecke (Ju).
173. *C. catinus* QUEL., Schüsselförmiger T.  
Mo. 300, MH-III/171 E  
30. 9. 64 Lw, zw. Buchenfallaub, hfg.
174. *C. cerussata* KUMM., Bleiweißer T.  
Mo. 290, MH-I/90 Gi!  
31. 10. 60 Mw und Lw (Ju); 14. 9. 69 Mw.
175. *C. clavipes* KUMM., Keulenfüßiger T.  
Mo. 262, MH-I/87 Egw  
II, im Moose der Kieferwä.; 1. 10. 50 Nw (Ju); 26. 9. 52 lichter Mw, moosig-gras. Waldboden (Ju); 19. 10. 55 trockener Kiefernbestand, truppweise (Ju); 2. 10. 62 Mw und Nw, moos. Boden, unter Kiefern (Ju); 14. 9. 69.
176. *C. flaccida* KUMM., Flatteriger T.  
Mo. 266 Egw  
7. 11. 54 Lw, zw. Fallaub (Ju); 19. 10. 55 auf Laubboden, truppweise (Ju); 5. 9. 55 Nw (Kiefer) (Ju); 2. 10. 62 Mw und Nw, moos. Boden, unter Kiefern (Ju).

177. *C. fritilliformis* GILL., Bitterer T.  
Mo. 319, MH-III/185 Gi!  
5. 11. 51 Mw (Ju); 8. 11. 51 Nadel- und Moosboden (Ju); 4. 11. 54 Nw, auf  
Nadelboden (Ju); 14. 11. 55 Nw, gesellig (weiß); 30. 11. 55 Mw auf Fallaub  
(Ju).
178. *C. fuliginipes* METR., Rauchgraustieliger oder Starrer T.  
Mo. 320 U  
11. 11. 63 Nw und Lw, SO-Ecke (Ju).
179. *C. gibba* KUMM., Ockerbrauner oder Gebuckelter T.  
Mo. 278, MH-I/86 E  
II, Lw; 13. 8. 62; 9. 8. 67 Lw; 14. 9. 69.
180. *C. gilva* KUMM., Fahlgelber T.  
Mo. 267, MH-III/170 Egv  
7. 10. 41 Mw (Ju); 31. 8. 57 Mw (Ju); 2. 10. 62; 1. 9. 63; 14. 9. 69 Mw.
181. *C. hydrogramma* SING., Ranziger T.  
Mo. 309 U  
2. 10. 62 Lw.
182. *C. incilis* QUEL., Kerbrandiger T.  
Mo. 283, MH-III/172 E  
8. 11. 32 Nw; 3. 11. 42 Lw und Mw (Ju); 22. 11. Fichtenwald (Ju).
183. *C. inversa* QUEL., Fuchsiger T.  
Mo. 265, MH-I/88 Egv  
9. 9. 30 unter Fichten; 20. 10. 37 Mw; 1. 9. 40 Mw; 3. 11. 42 Lw und Mw;  
9. 10. 45 Lw, auf Fallaub, gesellig; 11. 11. 63 Mw, SO-Ecke (Ju); 10. 11. 64  
Fichtenwald (Ju); 14. 9. 69; 9. 10. 70 Nw.
184. *C. vitua* METR., Faserstieliger T.  
Mo. 318, MH-III/191 oS  
12. 10. 43 Laubb., ges., moos. Bo. (Ju); 29. 9. 62 Nw (Ju).
185. *C. nebularis* KUMM., Nebelgrauer T. oder Graukappe  
Mo. 259, MH-I/94 jEm, Nab  
I, an waldigen Stellen, herdenweise; Oktober 29 (Ju); 22. 6. 49 (Ju); 31. 10. 60  
Lw (Ju); 2. 10. 62; 12. 10. 62; 14. 9. 69; 26. 9. 70.
186. *C. obsoleta* QUEL., Rasiger T.  
Mo. 306, MH-III/190 Us  
22. 8. 40 Lw, Laubboden, büschelig (Ju).
187. *C. odora* KUMM., Anis-T.  
Mo. 261, MH-I/95 E  
I, in Wäldern; 30. 10. 34 (Ju); 15. 10. 39 Lw (Ju); 20. 10. 43 Lw (Ju);  
23. 10. 55 Lw (Ju); 2. 10. 62 Lw; 14. 9. 69.
188. *C. phyllophila* QUEL., Blätter-T.  
Mo. 258, MH-I/(90) Gi!  
16. 10. 31 Lw, truppweise (Ju); 12. 10. 62.
189. *C. pithyophila* GILL., Nadeln-T.  
Mo. 291, MH-I/91  
16. 11. 42 (Ju); 7. 7. 49 zw. Nadeln und Laub (Ju); 14. 10. 57 Nw.
190. *C. squamulosa* LGE., Schuppiger T.  
Mo. 277, MH-III/173 E  
5. 11. 51; 30. 9. 60 Lw (Ju).

191. *C. suaveolens* KUMM., Duft-T.  
Mo. 308, MH-III/178 Us  
Ende Oktober 54, Laubboden (Ju); 24. 10. 55 Nw.
192. *C. tornata* QUEL., Gedrechselter T.  
Mo. 299, MH-III/189 U  
21. 10. 54, Lw-Lichtung am Fichtenwaldrand, ges. (Ju).
193. *C. umbilicata* SING., Nabel-T.  
Mo. 317, MH-III/182 Us  
6. 11. 52 Lw, Laubboden (Ju); 2. 10. 64.
194. *C. vermicularis* QUEL., Lärchen-T.  
Mo. 287, MH-III/174 E  
21. 7. 65 Nw, gern unter Lärchen, Nordteil (Ju).
195. *C. vibecina* QUEL., Geriefter T.  
Mo. 324, MH-III/181 oS  
5. 11. 51 Mw (Ju).
- Gattung: *Collybia*, Rübbling
196. *C. butyracea* QUEL., Kastanienroter R.  
Mo. 552, MH-I/103 Egw  
13. 1. 34 Lmw (Ju); 12. 8. 54 unter Fichten; 30. 9. 55 Mw (Ju).
197. *C. butyracea* var. *asema* (FR.), Horngrauer R.  
Mo. (552), MH-III/160 Egw  
3. 11. 51 Lw (Ju); 14. 10. 58 Mw (Ju); 2. 10. 62; 1. 9. 63; 8. 11. 64.
198. *C. confluens* KUMM., Knopfstieliger R.  
Mo. 538, MH-III/154 oS  
23. 8. 32 unter Buchen (Ju).
199. *C. crassipes* (SCHFF.), Korkstieliger R.  
Mo. 554 Egw (ohne Stiel)  
11. 11. 52 Lw (Ju).
200. *C. distorta* QUEL., Verdrehter R.  
Mo. 556, MH-III/162 Egw  
6. 7. 64 Mw, Wilchwitzer Ecke (Ju).
201. *C. dryophila* KUMM., Waldfreund-R.  
Mo. 550, MH-I/102 Egw  
I, in Wäldern und auf Grasplätzen, gesellig.
202. *C. exculpta* GILL.  
Mo. 551 Egw  
25. 8. 70 Lmw, bes. Birken; Lamellen schön zitronengelb (det. HOFMANN).
203. *C. fusipes* QUEL., Spindeliger R.  
Mo. 553, MH-III/159 Egw (ohne Stiel) Nab  
I, rasig am Grunde alter Laubbäume; 22. 7. 51 Lw; 6. 8. 45 an Buchen-Stu.  
(Ju); 6. 7. 64 Mw, Wilchwitzer Viertel (Ju).
204. *C. hariolorum* QUEL., Striegelstieliger R.  
Mo. 537, MH-III/157 U  
14. 7. 49 Nw, Nadelbo: mit moos. Stellen, in Büscheln, ges. (Ju); Oktober 62  
an Lh-Stu, büschelig, Nordteil (Ju).
205. *C. ingrata* QUEL., Steifstieliger R.  
Mo. 539, MH-III/(154) oS?  
Oktober 32 auf Fichtennadelbo., vermischt mit Laub, ges., büschelig (Ju).

206. *C. maculata* QUEL., Gefleckter R.  
Mo. 555, MH-I/104 U  
II, Nw, fast rasig; 2. 11. 32 unter Fichten (Ju); 26. 5. 49 Nw (Ju); 30. 9. 63;  
12. 10. 62.
207. *C. peronata* SING., Brennender R.  
Mo. 533, MH-III/155 U  
5. 8. 44 Laub- und Nadelbo. (Ju); 7. 7. 49 Nadel- und Laubbo. (Ju).
208. *C. succinea* QUEL., Bernsteinbrauner R.  
Mo. 545 E  
2. 10. 52 unter Fichten, Nadelbo. (Ju); 30. 10. 52 Lw; 17. 8. 64 gras.-lichtes  
Gebüsch (Ju), jetzt selten geworden.  
Gattung: *Fayodia*, Rußnabeling
209. *F. maura* SING., Kohlennabeling  
Mo. 798, MH-III/128 oS  
1. 12. 51 Lw, Mw mit Kiefer, moos. Boden (Ju).  
Gattung: *Gerronema*, Goldnabeling
210. *G. fibula* SING., Heftel-Helmling  
Mo. 246, MH-III/123 oS  
September 70 an feuchten gras.-moosigen Stellen  
Gattung: *Laccaria*, Lacktrichterling
211. *L. amethystina* MURR., Violetter Lackpilz  
Mo. 248, MH-I/99 E  
I, in Wäldern; Oktober 40 Lw und Nw; 12. 10. 62; 1. 9. 63; 14. 9. 69.
212. *L. laccata* BK. et BR., Gemeiner Lackpilz  
Mo. 252, MH-I/98 E  
I, in Wä. und Gebüsch, auf Grasplätzen; 17. 9. 41; 27. 9. 43; 2. 10. 62;  
1. 9. 63; 14. 9. 69 Mw.
- 212a. *L. laccata* var. *rosella* BARSCH, rötliche Abart  
MH-I/(98) E  
14. 8. 30 Buschholz, im Gras; 30. 7. 62 Lw, an Wegrändern (Ju).  
Gattung: *Lentinellus*, Zählring
213. *L. cochleatus* KARST., Anis-Z.  
Mo. 500, MH-III/102 jE-Wü  
II, an Lh-Stu in Büscheln; 18. 9. 38 (Ju); 5. 11. 38 (Ju); 20. 9. 43 an Stu.;  
14. 9. 65.
214. *L. vulpinus* KÜHN. et MRE., Merismatischer Z.  
Mo. 508  
4. 7. 56 an Buchenstubben (Ju).  
Gattung: *Lepista*, Rötelritterling
215. *L. nuda* CKE., Violetter R.  
Mo. 822, MH-I/62 E  
I, bes. im Wald; 2. 10. 62; 8. 11. 64 Lw; 3. 11. 65; 14. 9. 69; 15. 10. 70.
216. *L. personata* CKE., Maskierter R.  
Mo. 823, MH-I/63 E  
4. 11. 64 auf Wiese am Wegrand zw. Bocka und Pöppchen.  
Gattung: *Lyophyllum*, Rasling oder Graublatt
217. *L. decastes* SING., Brauner Ra.

- Mo. 477, MH-I/64 E  
26. 9. 52 am Waldgraden, auf Laubboden, ges. (Ju).
- 217a. *L. decastes* var. *cinerascens*, Grauer Ra.  
2. 11. 43 Lw und Mw.
218. *L. fumosum* KÜHN. et ROM., Geselliger Ra.  
Mo. 476, MH-I/65 E  
6. 10. 49 Gras- und Laubbo., büschelig; Hut graugrün! (Ju).
219. *L. loricatum* KÜHN., Knorpeliger Ra.  
Mo. 475, MH-I/(65) E  
30. 10. 43 Lw, am gras. Weg (Ju); 26. 9. 52 Laubbo., am Graben, gesellig (Ju).
- Gattung: *Micromphale*, Stinkschwindling
220. *M. perforans* SING., Nadel-S.  
Mo. 588, MH-III/135 oS  
I, auf Fichtennadeln wie gesät; 16. 7. 55 auf Nadelbo. (Ju); 24. 10. 64;  
8. 11. 64.
- Gattung: *Melanoleuca*, Weichritterling
221. *M. brevipes* PAT., Kurzstieliger W.  
Mo. 418, MH-I/83 E  
10. 10. 52 Lw (Ju); 30. 10. 52 Lw (Ju).
222. *M. melaleuca* MRE., Gemeiner W.  
Mo. 425, MH-I/82 E  
Oktober 51 Lw (Ju).
223. *M. verrucipes* SING., Warzenfüßiger W.  
Mo. 412  
10. 11. 42 Lw.
- Gattung: *Marasmius*, Schwindling
224. *M. alliaceus* FR., Lauch-S.  
Mo. 638, MH-III/141 oS  
21. 7. 41 gras. Boden im Wald (Ju); September 55 Mw (Ju).
225. *M. lupuletorum* FR., Ledergelber S.  
Mo. 650, MH-III/137 oS  
14. 11. 51 Mw auf Fallaub (Ju).
226. *M. oreades* FR., Nelken-S.  
Mo. 645, MH-I/101 E  
I, gras. Wegränder; 18. 5. 65 (Ju); 14. 9. 69.
227. *M. prasiomus* FR., Großer Knoblauch-S.  
Mo. 639, MH-III/142 oS  
Oktober 41 auf Laub (Ju).
228. *M. scorodoni* FR., Knoblauch-S.  
Mo. 637, MH-I/100 Wü  
I, auf Gras- und Baumwurzeln; Sommer 67 auf Nadeln.
- Gattung: *Mycena*, Helmling
229. *M. alcalina* KUMM., Alkalischer H.  
Mo. 788, MH-III/117 U  
2. 10. 62 an morschen Stu., büschelig.
230. *M. epipterygia* S. F. GRAY, Dehnbarer H.  
Mo. 675, MH-III/115 oS  
20. 11. 51 (Ju); 30. 9. 61; 24. 10. 64; 8. 11. 64 Lw und Nw.

231. *M. excisa* GILL., Ausgeschnittener H.  
Mo. 790 oS  
13. 10. 45 Mw an Stu.
232. *M. galericulata* S. F. GRAY, Rosablättriger H.  
Mo. 768, MH-I/108 oS  
I, an Stu., rasig; 8. 10. 43 an Lh-wurzeln (Ju); 1. 12. 51 Mw. (Ju); 2. 10. 62
233. *M. galopoda* KUMM., Weißmilchender H.  
Mo. 688, MH-III/118 oS  
6. 6. 49 Nw.
234. *M. inclinata* QUEL., Geneigter H.  
Mo. 766, MH-III/104 oS  
17. 10. 32 (Ju).
235. *M. polygramma* S. F. GRAY, Rillstieliger H.  
Mo. 780, MH-III/103 oS  
I, an Stubben und Hölzern, büschelig.
236. *M. pura* KUMM., Rettich-H.  
Mo. 717, MH-III/122 oS  
I, auf Waldboden gesellig.
- Gattung: *Omphalina*, Nabeling
237. *O. oniscus* QUEL., Gelappter N.  
Mo. 235 oS  
2. 10. 62 an feuchten Wegen bei Langenleuba (Ju).
- Gattung: *Oudemansiella*, Schleimröbling
238. *O. longipes* Mos., Brauner S.  
Mo. 608, MH-I/(106) U  
24. 10. 64 an Eiche.
239. *O. mucida* v. HOEHN., Beringer S.  
Mo. 601, MH-III/167 Egw  
18. 9. 33 in der Nähe von Lh-stämmen (Ju).
240. *O. platyphylla* Mos., Breitblättriger S.  
Mo. 605, MH-I/105 Egw  
I, feuchte Wä. an Lh-Stu; 8. 8. 34 (Ju); 4. 12. 51 (Ju); 3. 4. 55 Lw an Stu  
(Ju); 21. 5. 67; 14. 9. 69.
241. *O. radicata* SING., Grubiger S.  
Mo. 602, MH-I/106 Egw  
I, Lw, auch an Stu; 17. 7. 52 (Ju); 13. 8. 62; 6. 7. 63; 30. 9. 64; 6. 8. 67 an  
Buche und Hainbuche; 14. 9. 69.
- Gattung: *Pseudoclitocybe*, Gabeltrichterling
242. *P. cyathiformis* SING., Kaffeebrauner G.  
Mo. 496, MH-III/195 E  
30. 10. 34 Nadel- und Moos-Boden (Ju); 8. 11. 64.
- Gattung: *Strobilurus*, Nagelschwamm
243. *S. tenacellus* SING., Bitterer N.  
Mo. 615, MH-III/148 U Wü  
I, Waldplätze, wurzelt auf eingesenkten Kiefernzapfen, truppweise; 2. 6. 63  
(Ju).
- Gattung: *Tephrocycbe*, Graublattröbling
244. *T. atrata* DONK, Traniger G.

- Mo. 561, MH-III/164 oS  
2. 10. 62 im Wald; 24. 10. 64; 8. 11. 64 an gras. Stellen.
245. *T. coracina* n. c., Brettstieliger G.  
Mo. 572, MH-III/166 E  
5. 7. 49 Nadelboden gemischt mit Laub (Ju).
246. *T. ozes* (FR. ss. RL.), Faserstieliger G.  
Mo. 571  
18. 10. 43 Lw (Ju).
247. *T. tesquorum* n. c., Flechtstieliger G.  
Mo. 573  
10. 11. 54 Nw (Ju).
- Gattung: *Tricholoma*, Ritterling
248. *T. albobrunneum* KUMM., Weißbrauner R.  
Mo. 359, MH-III/210 Gi!  
30. 9. 35 Nw und Lw (Ju); 2. 11. 54 Fichtenwald, auf trockenem Bo. (Ju);  
3. 11. 55 im Fichtenwald (Ju).
249. *T. album* QUEL., Strohblasser R.  
Mo. 378 Ne  
von SEIFFERT bestätigt, im Mw unter Buchen (oB).
250. *T. argyraceum* SACC., Silbergrauer R.  
Mo. 392 E  
12. 10. 33 Nw im Gras (Ju).
251. *T. caligatum* RL., Krokodil-R.  
Mo. 346, MH-III/204 E  
8. 11. 57 Mw und Nw (Ju).
252. *T. flavobrunneum* KUMM., Gelbblättriger R.  
Mo. 353, MH-I/69 Ne  
II, bes. unter Birken; 23. 8. 34 Mw (Ju); 20. 9. 43 Mw (Ju); 10. 8. 60 (Ju);  
September 63 Mw (Ju); 14. 9. 69.
253. *T. flovavirens* LUND., Grünling  
Mo. 365, MH-I/66 E  
I, bes. in sandigen Kiefernwä.; 1950 bis 1958 nicht mehr gefunden von  
SEIFFERT; 7. 9. 63 Mw (Ju).
254. *T. imbricatum* KUMM., Schuppiger R.  
Mo. 362, MH-I/73 Ne  
21. 10. 43 Nw (Ju); 5. 10. 52 Nw (Ju); 9. 10. 63 Nw, meist im Kiefernwald (Ju).
255. *T. inodermeum* GILL., Rissigfädiger R.  
Mo. 363 V?  
Ende November 29 Nw (Ju); 30. 8. 63 (Ju).
256. *T. irinum* KUMM., Veilchen-R.  
Mo. 386, MH-III/219 E  
5. 9. 40 Mw unter Buchen (Ju); 2. 10. 62 Lw.
257. *T. pardinum* QUEL., Tiger-R.  
Mo. 400, MH-I/74 Gi!!  
10. 10. 43 Lw, zw. Fallaub (Ju).
258. *T. persicinum* FR., Fleischblasser R.  
Ri. 142 E?  
16. 11. 42 Mw (Ju).

259. *T. pessundatum* QUEL., Getropfter R.  
Mo. 354, MH-I/171(?) Ne  
II, Nw; 25. 9. 31 Mw und Lw (Ju).
260. *T. portentosum* QUEL., Schwarzfaseriger R.  
Mo. 364, MH-I/75 E  
II, Nw; Oktober 29 (Ju); 20. 11. 37 Lw und Mw (Ju); Oktober und November  
52 (Ju); Oktober 64; 3. 10. 69.
261. *T. psammopus* QUEL., Lärchen-R.  
Mo. 360, MH-I/206 Egw  
17. 10. 43 Lw mit Lärchen (Ju).
262. *T. resplendens* QUEL., Gelbweißer R.  
Mo. 382, MH-III/(214) Em?  
14. 10. 37 Mw, gras. Boden (Ju).
263. *T. saponaceum* KUMM., Seifen-R.  
Mo. 383, MH-I/80 Ne  
16. 9. 52 Lw (Ju).
264. *T. subannulatum* BRES., Fastberingter R.  
Mo. 351, MH-I/70 E-nbZ  
13. 10. 70 Nw (Fichten), Geschmack erst mild, dann Nachgeschmack bitter.
265. *T. sulphureum* KUMM., Schwefel-R.  
Mo. 371, MH-I/67 Gi!  
I, Lw und Mw; 22. 9. 31 Lw (Ju); 10. 11. 42 Lw (Ju); 10. 10. 43 (Ju); 1. 9. 63;  
3. 10. 69; 9. 10. 70.
266. *T. terreum* KUMM., Erd-R.  
Mo. 404, MH-I/76 E  
I, bes. im Nw.
267. *T. vaccinum* KUMM., Wolliger R.  
Mo. 361, MH-III/207 Ne  
23. 8. 56 Nw (Sei.).
- Gattung: *Trichlomopsis*, Holzritterling
268. *T. rutilans* SING., Rötlicher H.  
Mo. 342, MH-I/81 Egw  
I, bes. am Grunde der Nh-Stu; 3. 8. 32 unter Fichten (Ju); 4. 9. 34 Nw (Ju);  
August 60 (Ju); 2. 10. 62; 1. 9. 63; 14. 9. 69 Nw.
- 268a. *T. rutilans f. variegatum* FR.  
MH-I/(81) E  
3. 8. 32 unter Fichten, mit Nußgeschmack (Ju).
- Gattung: *Xeromphalina*, Glöckchennabeling
269. *X. campanella* R. MRE., Geselliger G.  
Mo. 806, MH-I/109 oS  
II, an Nh rasig, im Nordteil.
- Familie: *Rhodophyllaceae*, Rötelpilze  
Gattung: *Clitopilus*, Schiefhut
270. *C. prunulus* KUMM., Mehlpilz  
Mo. 828, MH-I/59 E  
I, im Walde, bes. auf Waldwegen; Oktober 33 Mw, Rasenbo. (Ju); 2. 10. 62  
östl. Teil (Ju); 2. 9. 63 Lw, Waldwiese (Ju).

Gattung: *Rhodophyllus*, Rötling

271. *R. chalybaeus* QUEL., Schwarzblauer R.  
Mo. 937, MH-III/63 oS  
September 62 Lw, Laubboden (Ju).
272. *R. clypeatus* QUEL., Schild-R.  
Mo. 874, MH-I/61 E  
21. 5. 50 im Nordteil, am Straßengraben im Gras (Ju).
273. *R. mammosus* QUEL., Zitzen-R.  
Mo. 962, MH-III/54? Ne  
10. 10. 33 Lw, im Gras auf feuchtem Bo, an einer Schneise (Ju).
274. *R. pascuus* LGE., Kreuzsporiger R.  
R. 992  
II, bes. am Rände der Nadelwälder.
275. *R. porphyrophaeus* LGE., Porphyrbrauner R.  
Mo. 863, MH-III/58 Us  
23. 9. 52 Mw (Ju); 11. 10. 55 Mw und Lw, gras. Stellen (Ju).
276. *R. prunuloides* QUEL., Mehl-R.  
Mo. 856, MH-III/48 E  
September 55, Südteil, im Gras einer Straßenböschung (Ju).
277. *R. sericeus* QUEL., Seidiger R.  
Mo. 870, MH-III/52 Ne V  
August 30 an gras. Stellen (Ju).

Familie: *Cortinariaceae*, Haarschleierpilze

Gattung: *Cortinarius*, Schleierling

278. *C. alboviolaceus* FR., Weißvioletter Dickfuß  
Mo. 2017, MH-IV/190 Egw  
27. 9. 51 Nw (Ju).
279. *C. allutus* FR., Bereifter Klumpfuß  
Mo. 1854, MH-IV/150 Egw  
29. 9. 56 Nw.
- 279a. *C. allutus* var. *luteus*, gelbfleischige Abart  
9. 10. 63 Mw in tiefem Laubboden, neben Hebeloma (Ju).
280. *C. armeniacus* FR., Aprikosen-Wasserkopf  
Mo. 2146, MH-I/55 E  
I, Nw; 7. 7. 49 Nw (Ju).
281. *C. armillatus* FR., Geschmückter Gürtelfuß  
Mo. 2081, MH-I/53 jEm  
I, bes. im Nw; 5. 8. 30 Mw unter Birken (Ju); 17. 8. 36 (Ju); 21. 8. 39 (Ju);  
14. 9. 65 unter Birken, Riesenexemplare.
282. *C. azureus* FR., Violettblauer Dickfuß  
Mo. 2047, MH-IV/197 E  
November 29 Mw (Ju); 7. 8. 30 Lw (Ju); 17. 8. 34 unter Fichten (Ju).
283. *C. bivelus* FR., Birken-Gürtelfuß  
Mo. 2127, MH-IV/118  
14. 9. 35 Kiefern- und Lw (Ju); 20. 8. 50 Lw (Ju); von SEIFFERT bestätigt (oB).
284. *C. caninus* FR., Rostbrauner Dickfuß  
Mo. 2043, MH-IV/(196) E  
29. 9. 52 Mw (Ju); 29. 10. 52 Lw und Nw (Ju).

285. *C. collinitus* FR., Blaustiel-Schleimfuß  
Mo. 2054, MH-IV/146 E  
6. 10. 31 Nw (Ju).
286. *C. compar* WEINM., Lilafüßiger Schleimfuß  
Mo. 1864  
Oktober 31 Lw und Mw, von JUNG bestätigt (oB).
287. *C. cyanopus* RI., Kerblättriger Schleimkopf  
Mo- 1448  
54, im Lw, von JUNG und SEIFFERT bestätigt (oB).
288. *C. delibutus* FR., Blaublättriger Schleimfuß  
Mo. 2067, MH-IV/144 Egw  
I, Nw und Lw.
289. *C. elatior* FR., Langstieliger Schleimfuß  
Mo. 2057, MH-IV/148 Egw  
1. 12. 29 Mw (Ju); 29. 9. 51; 29. 10. 52 Mw mit Buchen (Ju); 26. 10. 55 Nw  
(Ju); 2. 10. 62; 17. 11. 70.
290. *C. irregularis* FR., Rostblättriger Wasserkopf  
Mo. 2190  
25. 9. 42 Nw (Ju).
291. *C. largus* FR., Blaßvioletter Schleimkopf  
Mo. 1942, MH-IV/162  
I, bes. Lw; 24. 8. 63 Lw bei Altmörbitz (Ju).
292. *C. mucifluus* ss. RI., K. et M., Geriefter Schleimfuß  
Mo. 2058, MH-IV/145 E  
18. 9. 33 Lmw (Ju); 26. 9. 51 Lmw (Ju); 2. 10. 62.
293. *C. mucosus* FR., Heide-Schleimfuß  
Mo. 2053, MH-I/50 E  
Sommer 33 Mw (Ju); 31. 8. 49 Nw (Ju); 6. 9. 62 Mw (Ju).
294. *C. multiformis* FR., Sägeblättriger Klumpfuß  
Mo. 1860, MH-IV/149 E  
28. 9. 51 (Ju); 29. 9. 45 Fichtengebüsch, ges. (Ju); 28. 9. 52 Mw unter  
Buchen (Ju).
295. *C. muricinus* FR., Violettfuchsigiger Dickfuß  
Mo. 1947, MH-IV/189 Egw  
12. 9. 49 Nw (Ju).
296. *C. obscurocyaneus* (SECR.), Dunkler Schleimkopf  
RI. 627  
16. 9. 52 (Ju); 1. 10. 52 Mw (Ju).
297. *C. orellanus* FR., Orangefuchsigiger Schleimkopf  
Mo. 1824, MH-IV/98 Gi!!!  
27. 8. 62 Lw (Ju); Sommer 68 im Lw (gemeldet, oB.).
298. *C. papulosus* FR., Körnigfädiger Schleimkopf  
Mo. 1887  
17. 9. 34 im Fichtenwald (Ju).
299. *C. praestans* GILL., Blaugestiefelter Schleimkopf  
Mo. 1922, MH-IV/166 E (Huthaut abziehen)  
September 35 Lw (Ju).
300. *C. purpurascens* FR., Purpurfleckender Klumpfuß

- Mo. 1968, MH-IV/163 Em  
15. 9. 50 Lw auf Laubboden (Ju).
301. *C. rigidus* FR., Glänzender Gürtelfuß  
Mo. 2208, MH-IV/134 oS  
28. 9. 62 Mw an verschlammten Waldwegen, bei Langenleuba (Ju); 2. 10. 62  
Mw (Ju).
302. *C. saniosus* FR., Gelbfaseriger Wasserkopf  
Mo. 1834, MH-IV/108 oS  
I, gras. Waldstellen.
303. *C. torvus* FR., Wohlriechender Gürtelfuß  
Mo. 2160, MH-IV/130 Ne  
5. 7. 49 auf Nadelboden (Ju); 3. 10. 62 (Ju).
304. *C. traganus* FR., Lila-Dickfuß  
Mo. 2015, MH-I/52 U  
I, Nw, hfg.
305. *C. turbinatus* (BULL.), Blaßblättriger Klumpfuß  
Mo- 1392 E  
9. 10. 63 Lw (Ju).
306. *C. vespertinus* FR., Blasser Schleimkopf  
Mo. 1863  
30. 9. 49 Mw (Ju).
307. *C. vibratilis* FR., Bitterster Schleimfuß  
Mo. 2071, MH-IV/142 U  
3. 9. 35 Mw (Ju); 10. 9. 52 Nw (Ju).
308. *C. violaceo-cinereus* FR., Violettgrauer Dickfuß  
Mo. 2022  
16. 9. 35 Mw (Ju).
309. *C. violaceus* FR., Dunkelvioletter Dickfuß  
Mo. 1808, MH-IV/105 E  
I, Lw.
- Gattung: *Gymnopilus*, Flämmling
310. *G. hybridus* SING., Faserigberingter F.  
Mo. 2252, MH-IV/91 U  
30. 10. 43 an Nh (Kiefer), büschelig (Ju); 24. 10. 49 Nh (Ju); 9. 11. 54 auf  
Nadelboden (Ju); 14. 9. 69.
311. *G. picreus* KARST., Staubstieliger F.  
Mo. 2247  
5. 11. 54 Nadelboden, ges. und büschelig (Ju).
312. *G. sapineus* R. MRE., Tannen-F.  
Mo. 2248, MH-IV/46 U  
I, meist büschelig an Nh; 21. 7. 30 Nw (Ju); 14. 11. 52 Nadelbo.; 2. 10. 62;  
7. 5. 63 Nw; 11. 11. 63 Mw und Nw, östl. Teil.
313. *G. spectabilis* SING., Rasiger Schüppling  
Mo. 2246, MH-IV/89 U  
23. 9. 22; 14. 9. 32 an Stämmen oder in der Nähe von Nh (Ju); 9. 9. 38 an  
Lh-Stämmen (Ju); 13. 9. 56 Lw, am Fuß von Stämmen (Ju); 22. 8. 61 an  
Linde (Ju).

Gattung: *Dermocybe*, Hautkopf

314. *D. anthracina* RI., Blutblättriger H.  
Mo. 1806, MH-IV/95 U  
13. 11. 51 Nw (Fichte und Kiefer) (Ju).
315. *D. cinnamomea* WÜ., Zimt-H.  
Mo. 1799, MH-IV/93 U  
I, im Wald; 30. 9. 35 Mw (Ju); 1. 10. 71 Nw.

Gattung: *Hebeloma*, Fälbling

316. *H. claviceps* KUMM., Kleienfüßiger F.  
Mo. 1714  
24. 10. 63 Lw, zw. Herbstlaub (Ju).
317. *H. crustuliniforme* QUEL., Tongrauer F.  
Mo. 1720, MH-I/49 U  
I, überall; 2. 10. 62 Mw, 12. 10. 62; 24. 10. 64.
- 317 a. *H. crustuliniforme forma*  
24. 10. 63 im Mw, dünnfleischige Abart mit grünlichgelben Lamellen (Ju).
318. *H. edurum* METR.  
Mo. 1727  
3. 10. 33 Lw im Gras (det. GRÖGER) (Ju).
319. *H. hiemale* BRES., Winter-F.  
Mo. 1736 U  
24.10. 63 im Gebüsch, zw. Laub in Gemeinschaft mit *H. claviceps* (Ju).
320. *H. radicosum* RI., Wurzelnder F.  
Mo. 1701, MH-IV/27 U  
3. 10. 62 Lw (Ju).
321. *H. strophosum* SACC., Beringter F.  
Mo. 1704 U  
22. 8. 61 Lw (Ju).

Gattung: *Inocybe*, Rißpilz, Faser- oder Wirrkopf

322. *I. cincinnata* QUEL., Lilaspitziger Wi.  
Mo. 1639, MH-IV/57 Gi!  
23. 7. 62 Mw (Ju).
323. *I. cookei* BRES., Knolliger Ri.  
Mo. 1581 E-IV!  
I, Nw 19. 8. 18.
324. *I. fastigiata* QUEL., Kegeliger Ri.  
Mo. 1585, MH-IV/45 Gi!  
25. 8. 50 Mw
325. *I. geophylla* KUMM., Erdblättriger Ri.  
Mo. 1593, MH-IV/58 Gi!  
2. 10. 62 Mw.
- 325 a. *I. geophylla var. lilacina* FR., violette Abart  
Mo. (1593), MH-IV/58a Gi!  
13. 9. 68 Lw.
326. *I. lacera* KUMM., Gemeiner Wi.  
Mo. 1645, MH-IV/65 Gi!  
23. 7. 62 Nw (Ju).
327. *I. obscura* GILL., Violettlicher Wi.

- Mo. 1637, MH-IV/56 Gi!  
23. 7. 62 Lw (Ju).
- Gattung: *Naucoria*, Schnitzling
328. *N. escharoides* KUMM., Weißwolliger S.  
Mo. 1751  
Oktober 52 Mw, an feuchten Stellen (Ju).
329. *N. suavis* BRES., Wohlriechender S.  
Mo. 1752  
20. 11. 51 Lw (Ju).
- Gattung: *Rozites*, Reifpilz
330. *R. caperata* KARST.  
Mo. 1807, MH-I/47 E  
I, Lw und Nw; nicht wieder gefunden.
- Familie: *Crepidotaceae*, Krüppelfußpilze  
Gattung: *Crepidotus*, Stummelfüßchen
331. *C. applanatus* KUMM., Flaches S.  
Mo. 2329 E?  
6. 10. 30 an Eichenzweiglein auf dem Bo. liegend (Ju).
- Gattung: *Tubaria*, Trichterschnitzling
332. *T. pellucida* GILL., Winter-T.  
Mo. 2320, MH-IV/23 E  
20. 12. 49 Nw, aber an verfaultem Birkenstamm (Ju); 3. 11. 54 auf Nadelboden (Ju).
- Familie: *Amanitaceae*, Knollenblätterpilze  
Gattung: *Amanita*, Wulstling, Knollenblätterpilz oder Scheidenstreifling
333. *A. alba* GILL., Weißer Sch.  
Mo. 1005 E-rgi!  
4. 9. 69 Mw, gras. Stellen.
334. *A. citrina* S. F. GRAY, Gelber Kn.  
Mo. 1021, MH-I/4 Gi!  
I, bes. im Nw, hfg.; 11. 9. 31 Lw, auch Nw (Ju); 22. 8. 45 feuchter Lw (Ju);  
13. 10. 50 Lw, gras. Bo. (Ju); 2. 10. 62; 30. 9. 64; 3. 11. 65; 14. 9. 69.
- 334a. *A. citrina* var. *alba* PRICE, Albino  
MH-I/(4) Gi!  
30. 9. 34 (Ju); 20. 9. 38 Lw und Nw (Ju); 20. 8. 45 Nw (Fichten) (Ju);  
2. 10. 62; 1. 9. 63; 30. 9. 64.
335. *A. crocea* SING., Orangebrauner Sch.  
Mo. 1006, MH-I/(12) E-rgi!  
13. 8. 62 Nw.
336. *A. fulva* FR., Gelbbrauner Sch.  
Mo. 1007, MH-I/(12) E-rgi!  
14. 9. 69 Mw.
337. *A. gemmata* GILL., Narzissengelber Wu.  
Mo. 1015, MH-I/10 V  
II, Nw, hinter Wilchwitz, selten.
338. *A. inaurata* SECR., Doppeltbescheideter Wu.

- Mo. 1001, MH-I/14 E  
II, Mw, selten.
339. *A. lividopallescens* GILL., Ockergrauer Sch.  
Mo. 1009, MH-I/(12) E-rgi!  
6. 9. 38 Lw (Ju); 8. 9. 63 Lw, südl. Teil (Ju).
340. *A. muscaria* HOOK., Fliegenpilz  
Mo. 1012, MH-I/8 Gi!!  
I, bes. Nw und Birkenwald, hfg.; 2. 10. 62; 1. 9. 63; 30. 9. 63 sehr hfg.;  
24. 10. 64 Nw; 3. 11. 65; 14. 9. 69.  
a) 11. 10. 51 Nw und Lw; Hut mehr blutrot als orange (Ju).
- 340a. *A. muscaria* var. *aureola* KALCHBR.  
MH-I/(8) Gi!!  
5. 11. 70 Hut leuchtendorange, ohne Fetzen
341. *A. pantherina* SECR., Pantherpilz  
Mo. 1014, MH-I/5 Gi!!  
II, bes. an Waldrändern; von SEIFFERT bestätigt (oB); 25. 6. 63 Mw (Ju);  
7. 7. 65 Lw (Ju).
342. *A. phalloides* SECR., Grüner Kn.  
Mo. 1017, MH-I/1 Gi!!!  
I, Lw; 30. 9. 34 Lw; 8. 10. 49 Mw, Nw und Lw (Ju); 14. 9. 69.
343. *A. porphyria* SECR., Porphyrbrauner Wu.  
Mo. 1022, MH-I/11 Gi!  
II, Mw, bei Kraschwitz und Lohma; 6. 10. 51 Nw (Ju); 28. 7. 54 (Ju); 30. 9. 54  
Nw (Kiefer, Fichte) (Ju); 28. 8. 58 (Ju); 4. 9. 63 Lw und Nw, bei Kraschwitz  
(Ju); 15. 9. 64 lichter Nw, NO-Ecke (Ju).
344. *A. pseudorubescens* HERRE., Falscher Perlpilz  
Mo. 1026, MH-I/(7) Gi!  
24. 6. 62 Nw, bei Altmörbitz (Ju).
345. *A. rubescens* S. F. GRAY, Perlpilz  
Mo. 1025, MH-I/7 E  
I, bes. am Waldrand; 25. 7. 41 Lw (Ju); 13. 8. 62; 6. 7. 63 Lw; 1. 9. 64,  
bei Fürstenteich, Hut rotviolett (Ju); 14. 9. 69.
- 345a. *A. rubescens* f. *alutacea*  
14. 9. 64 Mw, NW-Ecke, einzeln (Ju).
- 345b. *A. rubescens* × *A. spissa*, Zwitter  
September 26 (Ju).
346. *A. spissa* KUMM., Grauer Wu.  
Mo. 1023, MH-I/6 E-lv!  
II, bes. Nw; 18. 7. 33 Fichtenwald (Ju); 6. 7. 63; 30. 9. 64; 14. 9. 69 Nw.
- 346a. *A. spissa* var. *alba*, weiße Abart  
20. 9. 38 Lw-Nw (Ju).
- 346b. *A. spissa* var. *excelsa* (FR.), Hoher Wu.  
Mo. (1023), MH-I/(6), MH-III/4 Ne  
August 25 Nw (Ju); 9. 8. 67 Nw.
347. *A. spreta* PECK, Aschgrauer Wu.  
Mo. 1011  
6. 10. 36 Lw (Ju); 12. 8. 62 bei Neuenmörbitz (Ju); 13. 8. 62 Lw.
348. *A. vaginata* QUEL., Grauer Sch.

- Mo. 1003, MH-I/13 E-rgi!  
I, in Wä.; 14. 9. 35 Lw, Waldrand im Gras (Ju).
- 348a. *A. vaginata* var. *badia* SCHFF., Kastanienbrauner Sch.  
MH-I/(13) E-rgi!  
1. 9. 30 Lw; 8. 7. 63 Lw-rand, nicht hfg. (Ju); 7. 7. 65 Lw (Ju); 9. 8. 67 im Fichtenwald.
- 348b. *A. vaginata* var. *plumbea* SCHFF., Bläulichgrauer Sch.  
MH-I/(13) E-rgi!  
August 25 Lw (Ju).
349. *A. verna* PERS., Weißer Kn.  
Mo. 1018, MH-I/2 Gi!!!  
2. 7. 53 Lw (Sei.); 21. 8. 62 Lw, östl. Teil (Ju); 25. 8. 70.
350. *A. virosa* FR., Spitzhütiger Kn.  
MH-I/3 Gi!!!  
24. 7. 60 Lw bei Langenleuba (Ju); 5. 9. 63 Lw, Buschaer Teil (Ju); 5. 8. 66 Lw, von K. BESSER gefunden, 2 Stück.
- Gattung: *Pluteus*, Dachpilsz
351. *P. atricapillus* SING., Rehbrauner D.  
Mo. 1055, MH-I/16 Egw  
I, an Stu., Spänen und Holzstückchen; 2. 6. 30 Mw; 3. 10. 33 (Ju); 18. 10. 43 Lw (Ju); 2. 10. 62; 8. 5. 63; 24. 10. 64; 9. 8. 67 an Birken-Stu.; 14. 9. 69.
352. *P. atromarginatus* KÜHN., Schwarzscheidiger D.  
Mo. 1054, MH-III/46 Egw  
24. 10. 64 Nw, NW-Ecke (Ju), an Stu. in Gemeinschaft mit *P. atricapillus*.
353. *P. nanus* KUMM., Flockigbereifter D.  
Mo. 1087, MH-III/42 oS  
10. 10. 43 Lw an Stu. (Ju).
354. *P. pellitus* KUMM., Weißer D.  
Mo. 1049, MH-III/39? E  
4. 7. 62 Lh-Stu. (Ju).
355. *P. petasatus* GILL., Schuppiger D.  
Mo. 1051, MH-III/(39) E  
18. 8. 42 Mw (det. GRÖGER) (Ju).
356. *P. umbrosus* KUMM., Umbrabrauner D.  
Mo. 1059, MH-III/47 E  
10. 10. 43 Lw (Ju); 24. 10. 64 LH-Stu., NW-Ecke (Ju).
- Gattung: *Volvariella*, Scheidling
357. *V. speciosa* SING., Großer S.  
Mo. 1036, MH-I/15 Em  
6. 9. 40 auf Wiesen; Oktober 67 auf Acker.

#### B. Dunkelsporige Gruppe

Familie: *Agaricaceae*, Edelpilze

Gattung: *Agaricus*, Egerling

358. *A. arvensis* SCHFF., Weißer Anis-, Acker- oder Schaf-E.

Mo. 1153, MH-I/25 E

I, Wiesen, am Waldrand, hfg.; Spätsommer 29 Lw, Waldrand, auf verrottetem Laub von Linde und Buche (Ju); 25. 10. 55 Nw (Fichten) am Waldrand (Ju).

359. *A. lanipes* SING., Breitschuppiger E.  
Mo. 1132, MH-I/20 E  
7. 9. 63 (Ju); 14. 9. 69 Lw.
360. *A. perrarus* SCHULZ., Hohlstieliger Riesen-E.  
Mo. 1146 E  
II, auf gehäuften Nadeln im Nw.
361. *A. semotus* FR., Weinroter Zwerg-E.  
Mo. 1168 E  
14. 9. 35 Lw, Mw und Nw, auf modrigem Laubboden (Ju).
362. *A. silvaticus* SCHEFF., Wald-E.  
Mo. 1136, MH-I/21 E  
I, im Wald; 9. 9. 49 Nw (Ju); 18. 9. 49 Fichtenwald (Ju).
363. *A. silvicola* SACC., Dünnfleischiger Anis-E.  
Mo. 1147, MH-I/26 E  
I, im Wald; 2. 10. 62; 24. 6. 63 Mw (Ju); 3. 11. 65 Buchenwald; 14. 9. 69;  
26. 9. 71.
- Gattung: *Lepiota*, Schirmling
364. *L. clypeolaria* KUMM., Wolliggestiefler S.  
Mo. 1207, MH-III/19 E  
von SEIFFERT bestätigt (oB); 17. 8. 54 Lw (Ju).
365. *L. cristata* KUMM., Stink-S.  
Mo. 1188, MH-I/32 U  
14. 9. 69 Lw, an gras. Stellen.
366. *L. naucina* FR., Rosablättriger S.  
Mo. 1191, MH-III/18 E  
von SEIFFERT bestätigt (oB); 28. 8. 58 (Ju).
- Gattung: *Macrolepota*, Riesenschirmling
367. *M. procera* SING., Großer Schirmpilz oder Parasolpilz  
Mo. 1095, MH-I/29 jE (ohne Stiel)  
I, an lichten Waldstellen, hfg.; 25. 8. 33 Lw (Ju); 30. 10. 34 (Ju); 18. 10. 50;  
16. 10. 52; 14. 8. 53 (Ju); 30. 9. 60 Lw, Hut olivbraun (Ju); 2. 10. 62; 1. 9. 63;  
9. 8. 67; 14. 9. 69.
368. *M. rhacodes* SING., Rötender Schirmpilz  
Mo. 1098, MH-I/30 jE  
I, Nw; 28. 8. 30 Lw (Ju); 12. 11. 34 Nw (Ju); 16. 10. 52 Mw (Ju); 1. 9. 63;  
14. 9. 69; 26. 9. 70.
- Gattung: *Cystoderma*, Körnchenschirmling
369. *C. ambrosii* SM. et SING., Weißer K.  
Mo. 1233  
30. 8. 63 Lw (Ju).
370. *C. amianthinum* FAX., Amiant-K.  
Mo. 1230, MH-I/35 Ne  
II, im Wald und sonnige Triften; 10. 10. 40 im Moos an einer Waldschneise  
(Ju); 12. 10. 62 Nw.
371. *C. granulosum* FAX., Rostroter K.  
Mo. 1235, MH-III/29 Us  
6. 9. 31 Nw und Buchenwald (Ju).

Gattung: *Phaeolepiota*, Glimmerschüppling

372. *P. aurea* MRE., Goldschüppling

Mo. 1237, MH-IV/19

3. 9. 35 Waldgraben im Gras (Ju); 26. 10. 60 Lw, auf Erdboden neben Stu. (Ju).

Familie: *Strophariaceae*, Schuppenpilze

Gattung: *Hypholoma*, Schwefelkopf

373. *H. capnoides* KUMM., Rauchblättriger S.

Mo. 1496, MH-I/43 E

I, nur an Nh; 12. 9. 31 Nh-Stu. (Ju).; 12. 10. 49 Nh (Ju); 2. 10. 62; 24. 10. 64;  
8. 11. 64; 14. 9. 69.

374. *H. epixanthum* QUEL., Starkkriechender S.

Mo. 1498, MH-I/246 oS

18. 8. 45 auf Fichtennadeln im lichten Mw, büschelig (Ju); 5. 9. 50 an Nh-Stu  
(Ju); 23. 9. 54 Nw (Kiefer) (Ju).

375. *H. ericaceum* KÜHN., Heide-S.

Mo. 1508

3. 10. 62 Mw, am Waldrand, östl. Teil (Ju).

376. *H. fasciculare* KUMM., Grünblättriger S.

Mo. 1500, MH-I/44 Gi!

I, an Stu und auf dem Erdboden büschelig-rasig, gemein; September 32 (Ju);  
13. 8. 62; 8. 5. 63; 30. 9. 64; 14. 9. 69 an Lh- und Nh-Stu.

377. *H. radicosum* LCE., Wurzelnder S.

Mo. 1501, MH-IV/247 U

22. 3. 61 Mw, am Grund von Nh, bei Lohma (Ju).

378. *H. sublateritium* QUEL., Ziegelroter S.

Mo. 1499, MH-I/45 Ne

I, büschelig-rasig, bes. an Lh-Stu; Oktober 29 Lw (Ju); 30. 10. 34 an Stu  
(Ju); 27. 2. 51 (Ju); 2. 11. 54 an Stu (Ju); 23. 10. 55 meist Lw an morschen  
Stu (Ju); 13. 8. 62; 24. 10. 64; 14. 9. 69.

378a. *H. sublateritium* f. *lilacinum*, purpurfarbene Form

1. 10. 63 an Lh-Stu, NW-Ecke (Ju).

Gattung: *Kuehneromyces*, Stockschwämmchen

379. *K. mutabilis* SING., et SMITH, Lipperts-chen

Mo. 1560, MH-I/48 E (ohne Stiel)

I, an Lh, meist rasig, hfg.; 2. 10. 62; 8. 5. 63; 24. 10. 64; 14. 9. 69; 26. 5. 70;  
20. 5. 71.

Gattung: *Pholiota*, Schüppling

380. *P. adiposa* KUMM., Schleimiger S.

Mo. 1534, MH-IV/(234) Egw

3. 9. 30 Lh-Stu im Mw (Ju); 1. 10. 35 auf Fuß von stu (Ju); 3. 10. 49 am  
Baum-Stu (Ju); 7. 11. 63 an Buche, ges. (Ju); 14. 9. 69.

381. *P. alnicola* SING., Erlen-S.

Mo. 1557 Ne

13. 11. 34 Lw, Nw und Mw (Ju); 19. 10. 43; August 60 Mw an Stu (Ju),  
September-Oktober 62 Lw (Ju).

382. *P. apicrea* Mos., Weißbehängener S.

Mo. 1556, MH-IV/244 oS

2. 10. 62 in der Nähe an Stu.

383. *P. astragalina* SING., Safranroter S.  
Mo. 1551, MH-IV/240 U  
26. 9. 39 Nw, in der Nähe von Stu. (Ju).
384. *P. aurivella* KUMM., Goldfell-S.  
Mo. 1535, MH-IV/234 Egw  
II, an lebenden Laubbäumen bis in die Äste; 1. 10. 66.
385. *P. carbonaria* SING., Kohlen-S.  
Mo. 1545, MH-IV/243 Ne  
26. 5. 49 Nw an Waldrändern auf Brandstellen (Ju).
386. *P. flammans* KUMM., Feuer-S.  
Mo. 1530, MH-IV/235 U  
15. 10. 49 am Fuße einer Fichte in dichten Büscheln (Ju); 5. 8. 66.
387. *P. flavida* SING., Schwefelgelber S.  
Mo. 1552, MH-IV/241 U  
31. 8. 57 Nw, an Stu. (Ju).
388. *P. fusa* SING., Derbfleischiger S.  
Mo. 1555  
Oktober 54 an Lh-Stu, büschelig (Ju); 18. 10. 60 an Nh-Stu (Ju).
389. *P. gummosa* SING., Blasser S.  
Mo. 1544, MH-IV/236 oS  
11. 10. 49 an Lh; Oktober 54 Lw, an Stu, büschelig.
390. *P. lenta* SING., Tonweißer S.  
Mo. 1543, MH-IV/239 Us  
17. 10. 43 Mw (Ju); 2. 11. 43 Lw (Ju); 2. 10. 62; 12. 10. 62 Mw auf Fichtenzapfen (Ju).
391. *P. lucifera* QUEL., Fettiger S.  
Mo. 1536  
1. 10. 34 Lh-Stu (Buche, Linde) (Ju); 6. 9. 40 Eichen-Stu; 18. 9. 41 Lh;  
11. 10. 49 an Holzstückchen in der Erde; 2. 10. 62.
392. *P. lupina* (FR.), Glatter S.  
Mo. 1549 U  
27. 11. 51 Mw (Ju); 8. 12. 52 Nw; 28. 7. 62 Lw, einzeln auf trockenem Bo.  
unter Buchen, bei Klausä (Ju).
393. *P. mixta* SING., Runzeliger S.  
Mo. 1550  
9. 5. 50 Lw an einer Schneise, Gras- und Laubbo. (Ju).
394. *P. spumosa* SING., Nadel-S.  
Mo. 1547, MH-IV/237 U  
29. 9. 52 Mw mit Nh-Stu, auf dem Bo an verwesenen Holzresten; 18. 10. 60  
Mw und Nw (Ju); 28. 7. 62 Mw (Ju).
395. *P. squarrosa* KUMM., Sparriger S.  
Mo. 1529, MH-IV/233 Ne  
I, am Grunde der Stämme; 19. 10. 32 an Buchenstamm (Ju); 5. 10. 38 an  
Fichten? (Ju); 2. 10. 62; 15. 10. 70; 26. 9. 71.
395. *P. subsquarrosa* (FR.)  
Mo. 1540  
Oktober 29 (Ju); 22. 10. 43 Lh-Stu und Lh-wurzeln (Ju).

Gattung: *Psilocybe*, Kahlkopf

397. *P. merdaria* RL., Dung-K.  
Mo. 1512, MH-IV/263 oS  
August 62 auf Pferdesemmel (Ju).
398. *P. semilanceata* QUEL., Spitzkegeliger K.  
Mo. 1514 oS  
20. 8. 62, an gras. Stellen (Ju).

Gattung: *Stropharia*, Träuschling

399. *S. aeruginosa* QUEL., Grünspan-T.  
Mo. 1489, MH-I/42 Em (Huthaut abziehen)  
16. 9. 41 (Ju); 13. 10. 45 Lw (Ju); 12. 10. 62; 24. 10. 64 Lw; 4. 10. 70.
400. *S. coronilla* QUEL., Krönchen-T.  
Mo. 1483, MH-IV/258 Us  
14. 9. 35 Lw (Ju); 2. 10. 62, gras. Wegrand.
401. *S. semiglobata* QUEL., Halbkugeliger T.  
Mo. 1495, MH-IV/253 U  
30. 9. 60, am gras. Waldweg (Ju).

Familie: *Bolbitiaceae*, Mistpilze

Gattung: *Agrocybe*, Erdschüppling

402. *A. dura* SING., Rissiger Ackerling  
Mo. 1468, MH-IV/229 Me  
25. 6. 50 auf Kartoffelfeld bei Wilchwitz.
403. *A. praecox* FAY., Früher E.  
Mo. 1469, MH-IV/227 E  
I, überall; 12. 4. 19; 17. 6. 61 Lw (Ju); 2. 6. 63; 8. 6. 65 Lw (Ju).
404. *A. sphaeromorpha* (BULL.), Späte E.  
Mo. 1581, MH-IV/228 E  
24. 10. 64 Mw, auf dem Bo., Wilchwitzer Ecke (Ju); 5. 11. 70.

Gattung: *Conocybe*, Samthäubchen

405. *C. tenera* KÜHN., Rotstieliges S.  
Mo. 1424, MH-IV/201 oS  
2. 10. 62 gras. Wegrand.

Familie: *Coprinoaceae*, Tintenpilze

Gattung: *Coprinus*, Tintling

406. *C. atramentarius* FR., Falten-T.  
Mo. 1243, MH-I/38 jE  
I, auf fettem Bo. in dichtgedrängten Haufen; 9. 5. 60 (Ju); 8. 11. 64, gras.  
Stellen.
407. *C. comatus* S. F. GRAY, Schopf-T.  
Mo. 1240, MH-I/37 jE  
9. 10. 70 Schuttplätze am Waldrand.
408. *C. disseminatus* S. F. GRAY, Gesäter T.  
Mo. 1289, MH-IV/307 oS  
I, überall, bes. an und neben morschen Stu; Juli 68 Lw (Eiche).
409. *C. ephemerus* FR., Morgen-T  
Mo. 1293, MH-IV/313 oS  
I, unmittelbar auf Strohmist.

410. *C. micaceus* FR., Glimmer-T.  
Mo. 1264, MH-I/39 jE  
24. 10. 64; 8. 11. 64 auf dem Boden und um Stubben.  
Gattung: *Panaeolina*, Heudüngerling  
411. *P. foenicicii* R. MRE.  
Mo. 1402 oS  
I, auf Wiesen, bes. nach dem Heuschnitt.  
Gattung: *Panaeolus*, Düngerling  
412. *P. leucophanes* BK. et BR. Weißer D.  
Mo. 1404 oS  
28. 7. 30 Lw, im Gras (Ju).  
413. *P. papilionaceus* QUEL., Blasser D.  
Mo. 1403, MH-IV/267 oS  
I, bes. auf gedüngten Äckern.  
Gattung: *Psathyrella*, Faserling  
414. *P. candolleana* MRE., Behangener F.  
Mo. 1350, MH-I/41 E  
6. 7. 63 Lh-Stu, büschelig, nach dem Regen massenhaft.  
415. *P. cotonea* K. et M., Langstieliger F.  
Mo. 1356, MH-IV/289 V  
27. 8. 36 (Ju); 30. 9. 55 Lw (Ju); 7. 9. 56 (Ju).  
416. *P. fatua* K. et M., Tonblasser F.  
Mo. 1399  
I, in Gebüsch.  
417. *P. gossypina* P. et D., Seidenstieliger F.  
Mo. 1372  
14. 10. 45 Mw (Ju).  
418. *P. hydrophila* R. MRE., Zartbehangener F.  
Mo. 1381, MH-I/40 E (als Suppenpilz, aber nicht in größeren Mengen), Nab  
10. 10. 43 Lw, Laubbo (Ju); 17. 10. 43 Lw, moosiger Grund (Ju); September  
52 (Ju); 14. 9. 69; 13. 7. 70.  
419. *P. sarcocephala* SING., Fleischbrauner F.  
Mo. 1341, MH-IV/286 oS  
17. 11. 54 Lw, in der Nähe von Stu (Ju); 1. 9. 55 Nw an Nh-Stu (Ju).  
420. *P. spadicea* SING., Schokoladenbrauner F.  
Mo. 1342, MH-IV/284 E  
I, am Grunde der LH-Stämme, büschelig; 24. 9. 33 Buchen-Stu (Ju); 18. 6. 49  
in der Nähe an morschen Lh-Stu (Ju); 24. 10. 64 Lw (Ju).  
421. *P. velutina* SING., Tränender Saumpilz  
Mo. 1354, MH-IV/288 U  
6. 9. 31 (Ju); 25. 6. 50 Lw, an Wegen (Ju); 16. 9. 52 Lw, Laubbo., rasig,  
massenhaft, an morschen Stu (Ju); 2. 7. 63 Lw (Linde).

Ordnung: *Polyporales*, Zähpilzartige

Familie: *Polyporaceae*, Zähpilze

Gattung: *Flammulina*, Winterpilz

422. *F. velutipes* SING., Samtfußrübling  
Mo. 618, MH-I/107 E (ohne Stiel)

- I, an verschiedenen Lh; 14. 11. 51 an Buchenstämmen (Ju); 24. 10. 64;  
26. 11. 70 büschelig an Lh.
- Gattung: *Lentinus*, Sägeblättling
423. *L. cyathiformis* BRES., Becherförmiger S.  
Mo. 107, MH-II/86 Wü  
18. 9. 62 an bemoosten Buchen-Stu (Ju); November 63 Lh-Stu (Ju).
424. *L. lepideus* FR., Anis-S.  
Mo. 109, MH-III/99 jE  
29. 6. 51 Nh-Stu; 27. 6. 52 Nh-Stu; 8. 5. 63 Buchen-Stu (Ju).
- Gattung: *Panus*, Knäueling
425. *P. conchatus* FR., Birken-K.  
Mo. 104, MH-III/93 U  
12. 7. 55 an Lh (Ju); 7. 6. 56 an Buchen-Stu; 61—63 Lh-Stu; 14. 6. 65 Buchen-Stu, massenhaft (Ju).
426. *P. rudis* FR., Borstiger K.  
Mo. 105, MH-III/94 U  
13. 5. 61 an Buchen (Ju).
427. *P. tigrinus* SINC., Getigarter K.  
Mo. 106, MH-III/95 U  
8. 8. 49 Lh-Stu (Ju); September 59 (Ju); 10. 6. 63 Lh (Ju).
- Gattung: *Panellus*, Zwergknäueling
428. *P. serotinus* KÜHN., Gelbstieliger Z.  
Mo. 596, MH-III/87 oS  
II, an Lh; 5. 10. 35 an Baum-Stu (Ju); 3. 10. 38 Lw, Lh-Stu; 14. 7. 43 (Ju);  
4. 7. 55 (Ju); 3. 10. 58 Lh-Stu (Ju).
429. *P. stypticus* KARST., Eichen-Z.  
Mo. 597, MH-III/97 U  
I, auf dem Kopfschnitt der Eichen-Stu, rasig, hfg.; 12. 9. 31 an Lh-Stu (Ju);  
24. 10. 64; 14. 9. 69.
- Gattung: *Piptoporus*, Hautporling
430. *P. betulinus* KARST., Birkenporling  
MH-II/41 jE U  
I, an Birken, oft in großer Zahl; 2. 10. 62; 9. 8. 67; 14. 9. 59.
- Gattung: *Pleurotus*, Seitling
431. *P. cornucopiae* PAUL., Rillstieliger S.  
Mo. 100, MH-III/92 jEgw  
19. 9. 21 an Lh-Stu (HEYNE).
432. *P. ostreatus* KUMM., Austern-S.  
Mo. 101, MH-I/110 jE  
von SEIFFERT bestätigt (oB); 18. 11. 57 Buchen-Stu (Ju); 27. 11. 63 an Buche  
(Ju); 8. 11. 64; 26. 11. 70 an Linde (braungrau).
- 432 a. *P. ostreatus f. salignus* PRL., Weiden-S.  
Mo. (101)  
Herbst 29 (Ju); Oktober 43; 9. 1. 62 an Birken, SO-Ecke (Ju).
- 432 b. *P. ostreatus f. spodoleucus* (FR.), Aschgrauer S.  
5. 11. 70 an Lh.
- Gattung: *Polyporus*, Stielporling
433. *P. brumalis* FR., Winter-P.

- Mo. 85, MH-II/35 oS  
6. 8. 42 Nw (Ju); 4. 5. 50 am Grund einer Buche (Ju); 22. 3. 61 am Waldrand (Ju); 6. 7. 63.
434. *P. ciliatus* FR., Mai-P.  
Mo. 84 oS  
8. 5. 63 im lichten Lw unter Buche (Ju); 4. 5. 65; 3. 5. 66; 22. 5. 68 an Lh.
435. *P. picipes* FR., Stüßriechender P.  
Mo. 94  
I, an Lh (Weide), bei Wilchwitz.
436. *P. squamosus* FR., Schuppiger P.  
Mo. 89, MH-I/169 jEgw  
I, an Lh-Stämmen; Mai 63 an Nh (Ju); 14. 9. 69 an Lh.

Familie: *Schizophyllaceae*, Spaltblätterpilze

Gattung: *Schizophyllum*, Spaltblättling

437. *S. commune* FR., Gemeiner S.  
Mo. 112, MH-III/96 U  
II, an frischgefallten und lebenden Stämmen, meist rasig; Oktober 29 auf abgeschnittenem Holz (Linde?) (Ju); 2. 10. 62 an Buche (Ju); 30. 9. 64; 8. 11. 64; 14. 9. 69.

Ordnung: *Cantharellales*, Leistenpilzartige

Familie: *Hydnaceae* (*Cantharellaceae*), Leistenpilze

Gattung: *Cantharellus*, Leisting

438. *C. cibarius* FR., Pfifferling  
MH-I/138 E  
I, Lw und Nw, gesellig; 13. 8. 62, selten.
439. *C. cinereus* PERS., Grauer L.  
MH-III/293 E  
7. 10. 40 Mw, auf tertiärem Sand und Lehm (Ju); Oktober 54 Nw (Ju); 2. 10. 62.
440. *C. infundibuliformis* FR., Trichter-Pfifferling  
MH-III/291 E  
29. 8. 30 Nw.
441. *C. lutescens* PERS., Gelbstieliger L.  
MH-III/295 E
- Gattung: *Craterellus*, Kraterpilz
442. *C. cornucopioides* FR., Herbst-Totentrompete  
MH-I/181 jE Wü  
I, in Wä, bes. an Abhängen, in Schluchten und feuchten Gebüsch; September 30 Laubho. (Ju); 4. 10. 32 Mw; August 54 Lw.
- Gattung: *Hydnum*, Stachelpilz
443. *H. compactum* PERS., Derber S.  
MH-II/87 U  
II, Nw und Lw; von SEIFFERT bestätigt (oB).
444. *H. imbricatum* FR., Habichtspilz  
MH-I/174 jE  
I, Nw, selten.
445. *H. repandum* FR., Stoppelpilz

MH-I/175 jE

I, Lw und Nw, selten; September 27 Lw, selten (Ju).

Familie: *Clavulinaceae*, Keulenpilze

Gattung: *Clavulina*, Koralle

446. *C. amethystina* DONK, Amethystfarbene K.

MH-II/129 E

11. 10. 52 Nadelbo (Ju); 30. 10. 52 Nadelbo (Ju).

447. *C. cinerea* SCHROET., Grauende K.

MH-II/128 E

I, Lw und Nw, hfg.; 2. 10. 62; 4. 9. 63 Mw (Ju).

448. *C. cristata* FR., Kammförmige K.

MH-I/176 E

I, Lw und Nw, auf nacktem Bo; 24. 9. 54 Fichtenwald, Nadelbo., feuchte Abhänge (Ju); 2. 10. 64; 14. 9. 69.

449. *C. rugosa* BULL., Runzelige K.

MH-II/121 E

2. 10. 62 Nw.

Familie: *Gomphaceae*, Korallenpilze

Gattung: *Ramaria*, Korallenpilz oder Koralle

450. *R. abietina* QUEL. (*invalii*), Grünspitziger K.

MH-II/133 Egw?

28. 8. 54 Lw, in der Nähe von Erlen, an feuchten Stellen, nach dem Regen massenhaft (Ju).

451. *R. aurea* QUEL., Goldgelber K.

MH-II/130 E

18. 8. 56 Fichtenwald (Ju).

452. *R. botrytis* PERS., Traubiger K.

MH-I/178 E

I, bes. im Buchenwald.

453. *R. condensata* QUEL., Gelbzähniger K.

Ri. 1692

5. 11. 38 Nw (Ju).

454. *R. flava* QUEL., Blaßgelber K.

MH-I/177 jE (in kleinen Mengen, gelbe Spitzen entfernen)

I, bes. im Buchenwald.

455. *R. stricta* QUEL., Steifer K.

MH-II/134 Ne

August 63 Mw an Lh-Stu, SW-Ecke (Ju); 19. 7. 65 Lh, massenhaft.

Familie: *Fistulinaceae*, Leberpilze

Gattung: *Fistulina*, Reischling

456. *F. hepatica* SCHEFF., Leberpilz

MH-I/168 jE

I, bes. an Eichen-Stu und gefällten Eichenstämmen; August 32 Eichen-Stu (Ju); August 44; 9. 8. 63 an Eichen (Ju).

Familie: *Clavariaceae*, Keulenpilze

Gattung: *Clavariadelphus*, Keulenpilz

457. *C. ligula* (SCHEFF.), Zungen-K.

MH-II/115 E

I, zw. abgefallenen Nadeln, einzeln; von SEIFFERT bestätigt (oB).

Familie: *Sparassidaceae*, Glucken

Gattung: *Sparassis*, Glucke

458. *S. crispa* WULF., Krause G.

MH-I/182 jE

I, Nw, am Grunde der Stämme, bes. an alten Kiefern; September 66 unter Kiefern; 14. 9. 69.

Familie: *Hericiaceae*, Stachelbartpilze

Gattung: *Hericum*, Stachelbart

459. *H. cirrhatum* NIKOL., Dorniger S.

MH-II/95 jE

22. 10. 69 an Eichen-Stu.

460. *H. ramosum* LETEL., Korallen-S.

MH-II/97 jE

Oktober 29 am Waldrand auf faulendem Buchenholz (Ju).

Ordnung: *Poriales*, Porenartige (*Aphylophorales*, Nichtblätterpilze)

Familie: *Thelephoraceae*, Erdwarzenpilze

Gattung: *Phylacteria* (*Thelephora*), Wärzling

461. *P. terrestris* PAT., Erd.-W.

MH-II/103 U

I, meist auf dem nackten Erdboden im Nw; um 53 Nw (Ju); 30. 9. 64; 11. 7. 66.

Familie: *Scutigeraceae*, Porenpilze

Gattung: *Albatrellus*, Fleischporling

462. *A. confluens* K. et P., Semmel-Porling

MH-I/166 jE

I, Nw; von SEIFFERT bestätigt (oB).

463. *A. cristatus* K. et P., Kamm-Porling

MH-II/30 U

II, in schattigen Buchenwäldern.

464. *A. ovinus* K. et P., Schaf-Porling

MH-I/165 jE

I, Nw, truppweise, oft zusammengewachsen; von SEIFFERT bestätigt (oB).

Gattung: *Bjerkandera*, Rauchporling

465. *B. adusta* KARST., Angebrannter R.

MH-II/42 U

24. 10. 64; 8. 11. 64 Lh-Stämme.

466. *B. fumosa* KARST., Graugelber R.

Krsl. S. 141 U

I, an Laubbäumen fast dachziegelig gehäuft; von SEIFFERT bestätigt (oB).

Gattung: *Grijola*, Büschelporling

467. *G. frondosa* S. F. GRAY, Laubporling oder Klapperschwamm

MH-II/32 jE

I, am Grunde alter Eichenstämme; 7. 10. 40 an Lh-Stamm (Ju); 26. 9. 64 Eichen-Stu (Ju); 17. 9. 63 (Ju).

Familie: *Stereaceae*, Schichtpilze

Gattung: *Osmoporus*, Fencheltramete

479. *P. odoratus* SING.

MH-II/59 oS

30. 7. 62 in der Nähe von alten NH-Stu (Ju).

Gattung: *Stereum*, Schichtpilz

480. *S. hirsutum* PERS., Striegeliger S.

MH-II/110 Nvb

12. 10. 62; 6. 7. 63; 8. 11. 64; 3. 11. 65, an Lh.

481. *S. purpureum* FR., Violetter S.

MH-II/111 Nvb

2. 10. 62; 30. 9. 64; 8. 11. 64 an Lh, gern an Birken-Stu.

482. *S. rugosum* FR., Runzeliger S.

MH-II/113 Nvb

24. 10. 64 an Erle; 8. 11. 64 an Lh.

Gattung: *Fomes*, Schichtporling

483. *F. fomentarius* KICHX., Echter Zunderschwamm

MH-I/171 U

7. 8. 40 an Nh (Ju); 8. 5. 63; 1. 9. 63.

Gattung: *Fomitopsis*, Baumschwamm

484. *F. annosa* KARST., Wurzel-B.

MH-II/62 U

I, an Nh-Wurzeln, gefährlicher Baumparasit (Rotfäuleerreger); 8. 3. 61 an Nh (Ju); 13. 8. 62; 6. 7. 63; 30. 9. 64; 14. 9. 69.

485. *F. pinicola* KARST., Rotrandiger B.

MH-II/63 U

7. 8. 40 an Nh (Ju); 24. 9. 49 an Fichten-Stu; 13. 8. 62; 3. 11. 65.

Gattung: *Gloeophyllum*, Braunblättling

486. *G. sepiarium* KARST., Zaun-B.

MH-II/60 U

September 30 an Kiefer; 30. 9. 39 auf abgeschnittenen Kiefern-Stu (Ju); Oktober 63 an Nh-Stu (Ju).

Gattung: *Pycnoporus*, Zinnoberschwamm

487. *P. cinnabarinus* KARST.

MH-II/56 Nvb

3. 9. 63 an Buchen (Ju); 14. 9. 69, Südteil.

Gattung: *Trametes*, Tramete

488. *T. betulina* PIL., Birken-T.

MH-II/51 U

24. 10. 64 an Birken-Stu.

488a. *T. betulina* f. *flaccida*

11. 11. 63 an Lh-Stu, Nordteil (Ju).

489. *T. confragosa* JOERST., Rötende T.

MH-II/55 U

II, an Lh, bes. Weiden; 24. 10. 64 an Eichen-Stu.

490. *T. gibbosa* FR., Buckel-T.

MH-II/52 Nvb

12. 10. 62; 28. 11. 63 an Buchen-Stu (Ju); 24. 10. 64; 14. 9. 69.

Familie: *Stereaceae*, Schichtpilze

Gattung: *Osmoporus*, Fencheltramete

479. *P. odoratus* SING.

MH-II/59 oS

30. 7. 62 in der Nähe von alten NH-Stu (Ju).

Gattung: *Stereum*, Schichtpilz

480. *S. hirsutum* PERS., Striegeliger S.

MH-II/110 Nvb

12. 10. 62; 6. 7. 63; 8. 11. 64; 3. 11. 65, an Lh.

481. *S. purpureum* FR., Violetter S.

MH-II/111 Nvb

2. 10. 62; 30. 9. 64; 8. 11. 64 an Lh, gern an Birken-Stu.

482. *S. rugosum* FR., Runzeliger S.

MH-II/113 Nvb

24. 10. 64 an Erle; 8. 11. 64 an Lh.

Gattung: *Fomes*, Schichtporling

483. *F. fomentarius* KICHX., Echter Zunderschwamm

MH-I/171 U

7. 8. 40 an Nh (Ju); 8. 5. 63; 1. 9. 63.

Gattung: *Fomitopsis*, Baumschwamm

484. *F. annosa* KARST., Wurzel-B.

MH-II/62 U

I, an Nh-Wurzeln, gefährlicher Baumparasit (Rotfäuleerreger); 8. 3. 61 an Nh (Ju); 13. 8. 62; 6. 7. 63; 30. 9. 64; 14. 9. 69.

485. *F. pinicola* KARST., Rotrandiger B.

MH-II/63 U

7. 8. 40 an Nh (Ju); 24. 9. 49 an Fichten-Stu; 13. 8. 62; 3. 11. 65.

Gattung: *Gloeophyllum*, Braunblättling

486. *G. sepiarium* KARST., Zaun-B.

MH-II/60 U

September 30 an Kiefer; 30. 9. 39 auf abgeschnittenen Kiefern-Stu (Ju); Oktober 63 an Nh-Stu (Ju).

Gattung: *Pycnoporus*, Zinnoberschwamm

487. *P. cinnabarinus* KARST.

MH-II/56 Nvb

3. 9. 63 an Buchen (Ju); 14. 9. 69, Südteil.

Gattung: *Trametes*, Tramete

488. *T. betulina* PRL., Birken-T.

MH-II/51 U

24. 10. 64 an Birken-Stu.

488a. *T. betulina* f. *flaccida*

11. 11. 63 an Lh-Stu, Nordteil (Ju).

489. *T. confragosa* JOERST., Rötende T.

MH-II/55 U

II, an Lh, bes. Weiden; 24. 10. 64 an Eichen-Stu.

490. *T. gibbosa* FR., Buckel-T.

MH-II/52 Nvb

12. 10. 62; 28. 11. 63 an Buchen-Stu (Ju); 24. 10. 64; 14. 9. 69.

491. *T. hirsuta* PIL., Striegelige T.  
MH-II/48 U  
8. 11. 32 an Lh-Stamm (Ju); 1. 9. 63; 30. 9. 64 an Lh.
492. *T. pubescens* PIL., Samtige T.  
Krsl. S. 163; Ri. 1492 U  
28. 7. 62 auf Reisig mit Scheitel aufgewachsen im Lw (Ju).
493. *T. quercina* PIL., Eichen-T. oder -Wirrling  
MH-II/58 Nvb  
I, an und auf Eichen-Stu, meist dachziegelig gehäuft, hfg.; September 29 an Eichen-Stu (Ju).
494. *T. suaveolens* FR., Anis-T.  
MH-II/53 Nvb  
II, an Weiden, SW-Ecke; von SEIFFERT bestätigt (oB).
495. *T. versicolor* PIL., Bunte T.  
MH-II/49 U  
I, an Lh-Stu, hfg.; 9. 7. 39 an morschen Buchen-Stu (Ju); 13. 8. 62; 1. 9. 63; 24. 10. 64; 14. 9. 69.
496. *T. zonata* PIL., Zonen-T.  
MH-II/(49) U  
17. 9. 49 an Lh-Stu (Ju); Oktober 55 an Buchen-Stu (Ju); 1. 11. 55 an Buchen-Stu, hfg.

Familie: *Ganodermataceae*, Lackpilze

Gattung: *Ganoderma*, Lackporling

497. *G. applanatum* PAT., Flacher L.  
MH-I/170 U  
I, an alten Lh-Stöcken; 2. 10. 62; 8. 5. 63; 30. 9. 64; 4. 6. 65 an Buchen-Stu (Ju); 14. 9. 69; 2. 9. 71.
498. *G. lucidum* KARST., Glänzender L.  
MH-II/73 U  
I, bes. am Grunde der Eichen, aber auch anderer Lh, öfter abnorm; August 29 an Eiche (Ju); 6. 7. 51 an Eichen-Stu (Ju); September 56 an Lh (Ju).

Familie: *Hymenochaetaceae*, Borstenpilze

Gattung: *Coltricia*, Dauerporling

499. *C. perennis* MURR., Gebänderter Proling  
MH-II/72 Nvb  
I, sandiger Nw auf dem Erdboden, meist einzeln; 3. 8. 66.
500. *C. tomentosa* MURR., Filziger D.
- 500a. *C. tomentosa* var. *triquetra* (SECR.), Dreieckiger D.  
MH-II/(72) U  
14. 11. 55 an altem Nh-Stu (Ju).

Gattung: *Hymenochaete*, Borsten-Schichtpilz

501. *H. rubiginosa* LEV., Rotbrauner B.  
MH-II/109 U  
2. 10. 62 an alten Lh-Stämmen.

Gattung: *Inonotus*, Schillerporling

502. *I. vulpinus* KARST., Fuchsroter S.

MH-II/(70) U

Oktober 33 an Fichten-Stu (Ju).

Gattung: *Phellinus*, Korkporling

503. *P. pini* P.L., Kiefern-K.

MH-II/67 U

September 61 Nw (Ju); 1. 9. 63 an Nh.

Ordnung: *Tulasnellales*, Tulasnellenartige

Familie: *Peniophoraceae*, Borstenrindenpilze

Gattung: *Aleurodiscus*, Mehlscheibe

504. *A. disciformis* PAT., Schüsselförmige M.

MH-II/107 U

2. 10. 62 an Buchen-Stu; 24. 10. 64 an Lh-Stu.

505. *A. polygonius* PERS., Höckerige M.

MH-II/(107) U

November 64 an dürrer herabgefallenen Lh-Zweigen (Ju).

Gattung: *Peniophora*, Borstenrindenpilz

506. *P. corticalis* BRES., Eichen-B.

Krsl. S. 111 U

I, auf Eichen-Stu, hfg.

?Familie: *Radulaceae*: Reibeisenpilz

Gattung: *Radulum*, Reibeisenpilz

507. *R. molare* FR., Dünnhäutiger R.

MH-II/100 oS

September 62 an toten Buchenästen (Ju).

Ordnung: *Dacrymycetales*, Tränenpilzartige

Familie: *Dacrymycetaceae*, Tränenpilze

Gattung: *Calocera*, Hörnling

508. *C. cornea* FR., Pfriemlicher H.

MH-II/(206) jEgw

8. 11. 64 an abgefallenen Eichenästen im Lw.

509. *C. viscosa* PERS., Wurzelnder H.

MH-II/206 jEgw

I, an Ng-Stu, hfg.; 7. 7. 34 (Ju); 13. 8. 62; 1. 9. 63; 8. 11. 64; 9. 8. 67 an Fichten-Stu; 14. 9. 69.

Unterklasse: *Phragmobasidiomycetidae*

Ordnung: *Tremellales*, Gallertpilzartige

Familie: *Tremellaceae*, Gallertpilze

Gattung: *Exidia*, Drüsling

510. *E. glandulosa* FR., Kegelwarziger D.

MH-II/196 oS

Oktober 33 auf Eichenholz (Ju).

511. *E. truncata* FR., Becherförmiger D.

MH-II/197 oS

18. 8. 36 an Eiche auf dem Waldboden (Ju).

Gattung: *Pseudohydnum*, Zitterzahn

512. *P. gelatinosum* KARST., Gallertartiger Z.

MH-II/205 Egw

Oktober 54 an morschen Kiefern-St (Ju).

Gattung: *Tremella*, Zitterling

513. *T. frondosa* FR., Blattförmiger Z.

Ri. 1750 Nvb

I, an Lh, bes. an Eichen-Stu.

Klasse: *Ascomycetes*, Schlauchpilze

Unterklasse: *Euascomycetidae*

Ordnung: *Pezizales*, Becherpilzartige

Familie: *Pyronemaceae*, (Becherpilze)

Gattung: *Aleuria*, Orangebecherling

514. *A. aurantia* FÜCK., Gemeiner O.

MH-I/196 E

II, auf feuchtem Waldbo, ges.; 11. 10. 43 Lw, auf fettem Bo (Ju); 2. 10. 62;  
12. 10. 62; 17. 10. 70.

Gattung: *Ovidea*, Öhrling

515. *O. cochleata* FÜCK., Schnecken-Ö.

MH-II/243, Mo. S. 94 E

30. 9. 35 Lw, im Gras mit Laub (Ju).

516. *O. concinna* SACC., Zitronengelber Ö.

Mo. S. 93

22. 9. 52 an Waldwiesenrändern; September 62 (Ju).

517. *O. leporina* FÜCK., Hasenohr

MH-I/(195), Mo. S. 94 E

13. 9. 31 auf Nadelboden (Ju).

518. *O. onotica* FÜCK., Eselsohr

MH-I/195, Mo. S. 94 E

II, Lw und Nw.

Familie: *Pezizaceae*, Becherpilze

Gattung: *Peziza*, Becherling

519. *P. badia* PERS., Kastanienbrauner B.

MH-I/197, Mo S. 101 E

4. 5. 50 auf dem Waldboden (Ju).

Familie: *Geoporaceae*, Löchertrüffeln

Gattung: *Hydnotria*, Morcheltrüffel

520. *H. tulasnei* BERK. et BR., Rotbraune Rasen-Trüffel

MH-II/284, Mo. S. 75 E

I, Lw und Nw.

Familie: *Helvellaceae*, Lorcheln

Gattung: *Discina*, Scheibling

521. *D. perlata* FR., Schildförmiger S.

MH-II/230, Mo. S. 92 jE

4. 5. 65 an Nh-Stu (Ju); 21. 6. 65 Nw, massenhaft.

Gattung: *Cyathipodia*, Langfüßler

522. *C. macropus* DENN., Grauer L.

MH-II/232, Mo. S. 90 oS

4. 5. 65 an Nh-Stubben.

Gattung: *Gyromitra*, Lorchel

523. *G. esculenta* FR., Frühjahrs-L.

MH-I/191, Mo. S. 91 Gi!

I, bes. in sand. Kiefernwä.; Mai 65 Nw.

Gattung: *Helvella*, Lorchel

524. *H. lacunosa* ARZ., Gruben-L.

MH-II/214, Mo. S. 88 E

21. 5. 65 Lw, an feuchten Stellen, massenhaft, Nordteil; 2. 8. 66; 6. 6. 67.

Gattung: *Paxina*, Rippenbecherling

525. *P. acetabulum* KRZE., Hochgerippter R.

MH-II/225, Mo. S. 90 E

26. 5. 49 Mw (Ju).

526. *P. sulcata* O. KRZE., Graubrauner R.

MH-II/226, Mo. S. 90 oS

28. 5. 35 Mw (Ju).

Ordnung: *Helotiales*, Kelchpilzartige

Familie: *Helotiaceae*, Kelchpilze

Gattung: *Helotium*, Becherpilz

527. *H. fructigenum* FÜCK., Gelbes Eichel-B.

MH-II/260, Mo. S. 45 oS

2. 10. 62 auf alten Fruchthüllen von Eicheln u. a., oft übersehen.

Familie: *Bulgariaceae*, Schmutzbecherlinge

Gattung: *Bulgaria*, Schmutzbecherling

528. *B. inquinans* FR., Schwarzer S.

MH-II/270, Mo. S. 43 oS

Sommer 52 im Lw an liegenden Stämmen (Ju).

Gattung: *Coryne*, Gallertbecher

529. *C. sarcoides* TUL., Violettroter G.

MH-II/272, Mo. S. 42 U

8. 11. 64 an Buchen-Stu.

Gattung: *Leotia*, Gallertkäppchen

530. *L. lubrica* ROST., Grüngelbes G.

MH-II/264, Mo. S. 40 jE

September 27 Lw, zw. Moos und Gras (Ju).

Ordnung: *Xylariales*, Holzkeulenpilzartige

Familie: *Xylariaceae*, Holzkeulenpilze

Gattung: *Ustulina*, Krustenpilz

531. *U. deusta* PÉTR., Brandiger K.

MH-II/276, Mo. S. 21 Nvb

12. 10. 62; 8. 5. 63; 6. 7. 63; 30. 9. 64 an Buchen-Stu.

Gattung: *Xylospheera* (*Xylaria*), Holzkeule

532. *X. hypoxylon* DUM., Geweihförmige H.

MH-II/282, Mo. S. 22 U

5. 11. 38 an Lh-Stu; 2. 10. 62.

533. *X. polymorpha* DUM., Vielgestaltige H.  
MH-II/283, Mo. S. 22 U  
von SEIFFERT bestätigt (oB); 14. 9. 69 an Lh-Stu.

Ordnung: *Tuberales*, Trüffelartige  
Familie: *Tuberaceae*, Echte Trüffeln  
Gattung: *Choironomyces*, Weißtrüffel

534. *C. maeandriiformis* VITT.  
MH-I/199, Mo. S. 81 E  
I, Lw und Nw, meist flach unter der Erde; August 28 (Ju); 15. 9. 53 Lw.

Gattung: *Tuber*, Echte Trüffel

535. *T. borchii* VITT., Weißliche Trüffel  
MH-II/290, Mo. S. 80 Ne  
20. 5. 63 unter Fichten, lichte Waldstelle, auf aufgewühltem Boden (Ju);  
5. 6. 63 Nw.

536. *T. excavatum* VITT., Ausgehöhlte Trüffel  
MH-II/291, Mo. S. 39 Ne  
Ende August 31 im Lw.

Ordnung: *Hypocreales*  
Familie: *Nectriaceae*, Pustelpilze  
Gattung: *Nectria*, Pustelpilz

537. *N. cinnabarina* TODE, Rot-P.  
MH-II/277, Mo. S. 20 Nvb  
2. 10. 62 an abgestorbenen Lh-Ästen.

Familie: *Hypomycetaceae*  
Gattung: *Hypomyces*

538. *H. chrysospermus* TUL., Goldschimmel  
MH-I/(150), Mo. S. 19 Nvb  
August 67 an Rotfußröhrling.

Klasse: *Myxomycetes*, Schleimpilze

Ordnung: *Liceales*  
Familie: *Lycogalaceae*  
Gattung: *Lycogala*, Milchstäubling

539. *L. epidendrum* FR., Blutmilchpilz  
MH-II/299 oS  
8. 5. 63; 21. 5. 67; 14. 9. 69 an faulenden Nh-Stubben.

Familie: *Reticulariaceae*  
Gattung: *Reticularia*, Netzpilz

540. *R. lycoperdon* BULL., Bovistähnlicher Schleimpilz  
MH-II/295 Nvb  
September 67 an Lh-Stubben.

Ordnung: *Physarales*  
Familie: *Physaraceae*  
Gattung: *Fuligo*, Lohblüte

541. *F. septica* GMEL., Gelbe L. oder Hexenbutter  
MH-II/298 Nvb  
13. 8. 62 auf altem Laub und an faulenden Stubben.

## Nachtrag

542. *Albatrellus cristatus* K. et P., Kamm-Porling  
MH-II/30 U  
26. 8. 55 Lw (Sei.)
543. *Agrocybe sphaleromorpha* (BULL.), Später Erdschüppling  
Mo- 1581, MH-IV/228 E  
24. 10. 64 Mw, auf dem Boden (Ju), Wilchwitzer Ecke.
544. *Macrolepiota gracilentata* SING., Zitzen-Schirmling  
Mo. 1103 E  
6. 10. 62 im Lw.
545. *Pluteus roberti* FR., Starrer Dachpilz  
Ri. 909  
6. 10. 62 an Lh-Stu. (Be.).
546. *Russula mustellina* FR., Wiesel-Täubling  
Mo. 2423, MH-V/83 E  
31. 7. 57 im Nw (Sei.).
547. *Russula olivascens* PERS., Gelbgrüner Täubling  
Mo. 2417, MH-V/120 E  
3. 7. 63 im Nw (Be.).
548. *Russula pulchella* BORSZ., Verblassender Täubling  
Mo. 2459, MH-V/109 Egw  
20. 9. 66 im Lw (Be.).
549. *Hypholoma marginatum* SCHROETER, Geselliger Schwefelkopf  
Mo. 1502, MH-IV/248 U  
11. 11. 61 an Nh-Stu. (Be.).

## Abkürzungen

### Genießbarkeit:

- E = eßbar  
jE = jung eßbar  
Em = eßbar als Mischpilz  
Egw = eßbar, aber geringwertig  
E-iv! = eßbar, aber leicht zu verwechseln!  
E-nbZ = eßbar nach besonderer Zubereitung  
E-rgi! = eßbar, aber roh genossen giftig!  
Gi! = giftig!  
Gi!! = sehr giftig!  
Gi!!! = tödlich giftig!  
Ne = nicht empfehlenswert  
Nab = nicht allgemein bekömmlich

- Nyb = nicht verwertbar  
 oS = ohne Speisewert  
 U = ungenießbar  
 Us = unschädlich  
 Wü = Würzpilz  
 (Wü) = Würzpilz, nur in kleinen Mengen  
 Zm! = zu meiden!

Ohne Genießbarkeitszeichen: Wert z. Z. nicht feststellbar.

Andere Abkürzungen:

- Lh = Laubholz  
 Lw = Laubwald  
 Lmw = Laubmischwald  
 Mw = Mischwald  
 Nh = Nadelholz  
 Nw = Nadelwald  
 Stu = Stubben  
 Wä = Wälder  
 bes. = besonders  
 Bo. = Boden  
 ges. = gesellig  
 gras. = grasig  
 hfg. = häufig  
 lehm. = lehmig  
 moos. = moosig  
 oB. = ohne Beleg, d. h. keine genaue Fund- und Datumsangabe  
 sand. = sandig  
 zw. = zwischen  
 s = selten  
 z = zerstreut  
 v = verbreitet  
 g = gemein

### Literaturnachweis

Vorbemerkung: Es sind hier nur die Werke aufgeführt, die im Literaturnachweis zum 3. Beitrag noch nicht genannt sind.

KÖHLER, W.: Flurgehölze im Raum Altenburg, 1965 (unveröffentlicht).

KREISEL, J.: Grundzüge eines natürlichen Systems der Pilze, 1969.

MOSER, M.: Basidiomyceten, II. Teil, Die Röhrlinge, Blätter- und Bauchpilze, 1955 (Mo-).

MOSER, M.: Basidiomyceten, II. Teil, Die Röhrlinge und Blätterpilze (Agaricales), 1967 (Mo.).

MICHAEL-HENNIG: Handbuch für Pilzfreunde, Band IV, 1967 und Band V, 1970 (MH-).

MÜLLER, A.: Die wichtigsten Waldgesellschaften des Leinawaldes, 1964 (unveröffentlicht).

SIMON, R.: Beiträge zur Verbreitung der Moose, Farne und Schachtelhalme im Waldgebiet der Leina, 1964 (unveröffentlicht).

Eingang: 15. 1. 1972

Verfasser: WALTER HOFMANN,

DDR - 74 Altenburg, C.-v.-Ossietzky-Str. 36