

Zur Lepidopterenfauna in den Kreisen Altenburg und Schmölln (Bezirk Leipzig)

Nachträge zu Bd. II, 169—190, Bd. III, 133—164
und Bd. V, 187—265

EGON JUNGSMANN

1. *Lycaena amandus* SCHM. — Heidebläuling

Diese bisher im Altenburger Gebiet noch nicht gefundene Bläulingsart, fing ich am 2. 7. 66 im Leina-Forst auf einer Waldwiese. Das Stück war nicht mehr frisch und ist möglicherweise aus dem Erzgebirge oder dessen Vorland zugewandert.

2. *Lycaena arcas* ROTT. (cf. IV, Nr. 12)

Der von Kurt Schädlich bei Schmölln festgestellte Bläuling, kommt auch auf einen engbegrenzten Wiesengelände bei Lossen westlich von Altenburg vor, jedoch war mir dieses Vorkommen jahrelang verborgen geblieben. Am 10. 8. 68 stellte ich 11, am 10. 8. 69 2 und am 29. 7. 70 7 Falter fest.

3. *Carcharodus alceae* ESP.

Beitrag von KURT SCHÄDLICH, Schmölln:

Am 27. 7. 71 1 Falter dieser Art als neu für die Lokalfauna auf einer trockenen Böschung unweit Altkirchen Kreis Schmölln festgestellt. Am 10. 8. 71 fand ich dort an den Beständen von *M. neglecta* 10 Raupen.

4. *Callimorpha dominula* (cf. III, Nr. 39)

Der in der Vergangenheit ziemlich seltene Falter tritt seit 1966 plötzlich im Leina-Forst häufig auf, so beobachtete ich am 2. 7. 66 24 Falter, am 16. 4. 67 fand ich ca. 150 Raupen, die prächtige Falter ergaben, darunter die gelbe f. *flava*.

5. *Orgyia gonostigma* F. — Eckfleck (cf. III, Nr. 45)

Bislang hielt ich die Art für verschwunden, am 10. 8. 69 gelang es mir jedoch ein frisches Stück bei Lossen zu fangen.

6. *Arctornis l-nigrum* MÜLL. (cf. III, Nr. 48)

Die in den letzten Jahrzehnten nicht gefundene Art fand ich am 5. 7. 68 in der Leina wieder, auch Kurt Schädlich konnte 1968 1 Falter als weiteren Beleg in der Leina fangen.

7. *Poecilocampa populi* L. — Kleine Pappelglucke (cf. IV, Nr. 27)

Bisher nur für Schmölln und Gößnitz nachgewiesen. Ich fand den Falter erstmals 1965 an Lichtquellen bei Altenburg, im Juli 1969 fand ich 1 Raupe in der Leina, die am 18. 10. 69 den Falter ergab. Am 14. 10. 69 und am 6. 11. 72 fand ich mehrere Falter an einer Lichtquelle in Kotteritz.

8. *Notodonta dromedarius* L. — Erlenzahns spinner (cf. III, Nr. 92)

Am 29. 4. 72 fand ich erstmals 1 Falter in der Leina an einer Erle sitzend, die Art war lange Zeit im Gebiet nicht mehr aufgefunden worden.

9. *Palimpsestis or* F. — Wollrückens spinner

P.or war bisher für Altenburg nicht nachgewiesen. Am 20. 5. 67 fand ich den ersten Falter in der Leina, dort am 5. 8. 67 1 F. der II. Gen. Am 19. 8. 70 auch durch L. F. bei Kotteritz festgestellt.

10. *Synanthedon culiciformis* L. — Birkenglasflügler (cf. V, Nr. 138)

Am 31. 5. 71 und am 5. 6. 71 gelang es mir je 1 Falter in der Leina auf Himbeerbüschen sitzend zu erbeuten. Der Falter war viele Jahrzehnte um Altenburg nicht mehr gefunden worden.

11. *Acronycta auricoma* F. (cf. V, Nr. 13)

Die bisher nur in der Leina gefundene Art, fand ich auch am 22. 5. 70 im Pahnauer Holz unmittelbar am Restloch.

12. *Triphaena orbona* HUFN. (cf. Nr. 66)

Die seltene Eule fand ich am 19. 8. 70 beim Lichtfang in Kotteritz.

13. *Cucullia artemisiae* HUFN. — Beifuß-Mönchseule

Um Altenburg bisher nicht nachweisbar, Herr Sykora Altenburg fand am 2. 7. 69 1 Stück der seltenen Art bei Regis an einer Lichtquelle.

14. *Brachionycha nubeculosa* ESP. (cf. V, Nr. 136)

Die bisher nur aus der Leina gefundene Art, fing ich am 24. 3. 68 auch im Kammerforst.

15. *Lithophane furcifera* HUFN. (cf. V, Nr. 143)

Neuerdings wieder für die Fauna belegt, durch einen Falter den ich am 18. 9. 68 nördlich von Altenburg fing.

16. *Conitra vau-punctatum* ESP. (cf. V, Nr. 159)

Die von Schädlich 1937 bei Schmölln gefundene Eule fing ich erstmalig am 12. 10. 71 durch L. F. in Kotteritz.

17. *Amathes lota* L. (cf. V, Nr. 165)

Am 12. 10. 71 erstmalig 2 Falter durch L. F. in Kotteritz.

18. *Enargia paleacea* ESP. (cf. V, Nr. 238)

Am 19. 8. 70 auch bei Kotteritz durch L. F. 2 Falter erbeutet.

19. *Erastria trabealis* SCOP. (cf. V, Nr. 257)

Am 7. 7. 69 fing Werner Sykora 1 Falter bei Regis, dieser Beleg ist seit über 100 Jahren der erste in neuerer Zeit.

20. *Phytometra festucae* L. (cf. V, Nr. 273)

Die in neuerer Zeit um Altenburg noch nicht gefangene Art fand ich erstmalig am 10. 8. 69 auf einer Talwiese bei Lossen, am 19. 8. 70 auch an der Pleiße bei Kotteritz.

21. *Laspeyria flexula* SCHIFF. (cf. V, Nr. 287)

Am 20. 7. 68 erstmalig 1 Falter in der Leina in einer Fichtenschonung gefangen.

22. *Zannclognatha nemoralis* F (cf. V, Nr. 293)

Am 22. 6. 70 erstmalig durch L. F. in Kotteritz festgestellt.

23. *Herminia tentacularia* L. (cf. V, Nr. 297)

Erstmalig am 5. 6. 71 in der Leina auf einer stark vergrasteten Erlenpflanzung 2 Falter gef.

24. *Hypena rostralis* L. (cf. V, Nr. 299)

Am 21. 3. 72 fand ich einen Falter an einer Hauswand in Kotteritz, auch diese Art war in neuerer Zeit nicht wieder nachgewiesen worden.

Von den 24 als Nachtrag aufgeführten Schmetterlingsarten sind 4 Arten neu festgestellt worden, bei den anderen 20 Arten handelt es sich um Bestätigungen von Funddaten die meist sehr weit zurückliegen bzw. an neuen Fundplätzen aufgetreten sind. Eine abschließende Auswertung zur Lepidopterenfauna erfolgt nach Abschluß des IV. Beitrages, der die Spanner behandelt.

Eingang: 6. 3. 73

Anschrift des Verfassers:

EGON JUNGMANN, DDR - 74 Altenburg, Friedrich-Engels-Str. 35