

Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg

ERWIN NAUMANN

Die Erforschung der Natur des Kreises Altenburg auf historischem und naturwissenschaftlichem Gebiet hat im Jahre 1977 einen Stand erreicht, der uns recht gute Kenntnisse über unser Heimatgebiet vermittelt. Es kann natürlich nicht von einer Vollständigkeit gesprochen werden, obwohl sich seit über 100 Jahren Wissenschaftler, sachkundig Interessierte vieler Berufe und Mitglieder verschiedener naturwissenschaftlicher und gesellschaftswissenschaftlicher Institutionen und Organisationen besonders nach 1945 bemühten, immer mehr Lücken zu schließen.

Auch die floristischen und faunistischen Ergebnisse wurden in den letzten Jahren weiter vervollkommen, und es wird auch ständig an neuen Erkenntnissen gearbeitet.

Bekannt ist auch, daß auf verschiedenen Gebieten in der Vergangenheit, die bis in das 19. Jahrhundert und noch weiter zurück reichen, von Naturfreunden Beobachtungen über die Existenz verschiedener Pflanzen- und Tierarten gemacht wurden, die allerdings leider nicht alle aufgezeichnet oder die Aufzeichnungen nicht veröffentlicht und aufbewahrt wurden.

Dadurch sind wertvolle Angaben verlorengegangen, die unsere heutige faunistische und floristische sowie andere Forschungstätigkeit erschweren.

Besonders auf dem Gebiete der Entomologie sind im Kreis Altenburg nur Teilergebnisse bekannt. Die *Lepidoptera* (Schmetterlinge) dürften durch die Arbeiten von SCHÄDLICH, GÜNTHER, JUNGMAHN und anderen noch am besten bekannt sein. Auch für die *Odonata* (Libellen) hat JUNGMAHN eine Grundlage für die weitere Bearbeitung gegeben.

Ungünstiger sieht es dagegen für die verschiedenen Ordnungen der Klasse *Hexapoda* (Insekten) aus. Da die *Hexapoda* die umfangreichste und auch zahlenmäßig größte Gruppe im Tierreich ist, fehlt es leider an Spezialisten und Interessenten für die faunistische Arbeit in unserem Kreisgebiet Altenburg.

Die nachstehende Übersicht soll verdeutlichen, daß die Lücken noch größer sind, als es auf den ersten Blick erscheint.

Unterklasse	<i>Apterygota</i>	(Ur-Insekten)
Ordnung	<i>Collembola</i>	(Springschwänze)
	<i>Protura</i>	(Beintastler)
	<i>Diplura</i>	(Doppelschwänze)
	<i>Thysanura</i>	(Borstenschwänze)
Unterklasse	<i>Pterygota</i>	(Flug-Insekten)
Ordnung	<i>Ephemeroptera</i>	(Eintagsfliegen)
	<i>Odonata</i>	(Libellen)
	<i>Plecoptera</i>	(Steinfliegen)
	<i>Embiodera</i>	(Embien)
	<i>Saltatoria</i>	(Heuschrecken)
	<i>Phasmida</i>	(Gespenstschrecken)
	<i>Diploglossata</i>	
	<i>Dermaptera</i>	(Ohrwürmer)
	<i>Mantodea</i>	(Gottesanbeter)
	<i>Blattaria</i>	(Schaben)
	<i>Isoptera</i>	(Termiten)
	<i>Zoraptera</i>	
	<i>Corrodentia</i>	(Staubläuse)
	<i>Mallophaga</i>	(Läuslinge)
	<i>Anoplura</i>	(Läuse)
	<i>Thysanoptera</i>	(Fransenflügler)
	<i>Heteroptera</i>	(Wanzen)
	<i>Homoptera</i>	(Pflanzensauger)
	<i>Hymenoptera</i>	(Hautflügler)
	<i>Coleoptera</i>	(Käfer)
	<i>Strepsiptera</i>	(Fächerflügler)
	<i>Megaloptera</i>	(Schlammfliegen)
	<i>Rhaphidides</i>	(Kamelhalsfliegen)
	<i>Planipennia</i>	(Echte Netzflügler)
	<i>Mecoptera</i>	(Schnabelfliegen)
	<i>Trichoptera</i>	(Köcherfliegen)
	<i>Lepidoptera</i>	(Schmetterlinge)
	<i>Diptera</i>	(Zweiflügler)
	<i>Aphaniptera</i>	(Flöhe)

Von diesen 33 Insektenordnungen können bisher nur zwei (*Lepidoptera* und *Odonata*) als bearbeitet gelten. Von den übrigen Ordnungen, die teilweise nur durch wenige Arten (*Rhaphidides* 11) vertreten sind, oder auch die Gruppe der Ordnung *Hymenoptera*, zu welcher die Hummeln, Wespen, Ameisen, Bienen u. a. gehören, liegen bis jetzt keine oder nur sehr spärliche Beobachtungsergebnisse aus dem Kreis Altenburg vor.

Die nachstehende Arbeit soll nun einen Einblick in die Faunistik der Ordnung *Coleoptera* (Käfer) geben. Als Grundlage dieser Zusammenstellung konnte ich nur die Angaben in „Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie“ von OTTO RAPP verwenden, die sich auf den Kreis Altenburg bezogen und diese durch andere Aufzeichnungen und Beobachtungen ergänzen.

Auf dem Gebiete der Entomologie (Insektenkunde) und besonders der *Coleoptera* (Käfer) liegen zwar Aufzeichnungen vor, die sich aber zum größten Teil in umfassenden Werken (RAPP 4 Bände) und Handskizzen befinden und sich über das Kreisgebiet hinaus erstrecken. Viele Ergebnisse gehen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und sagen über den gegenwärtigen Stand nur wenig aus. Das Ziel dieser Arbeit soll sein:

1. aus zugänglicher Literatur und Aufzeichnungen die gefundenen und nachgewiesenen Käfer des Kreisgebietes Altenburg zusammenzustellen und zu ordnen;
2. die bisherigen Ergebnisse durch Neufunde zu ergänzen;
3. einen Überblick über die noch vorkommenden, nicht mehr vorkommenden und neuerdings vorkommenden Käferarten zu bekommen.

Trotz dieser umfassenden Arbeit kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Sie kann lediglich eine Grundlage für die weitere faunistische Tätigkeit auf dem Gebiete *Coleoptera* sein.

Diese Arbeit stützt sich im wesentlichen auf fünf Quellen:

1. OTTO RAPP: „Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie“, Bände 1—4
2. Aufzeichnungen zur Sammlung von FRANZ TOTZAUER, Gößnitz
3. Systematische Sammlungsanstellung von FRANZ TOTZAUER, Gößnitz, in 4 Büchern
4. Funde und Aufzeichnungen von EGON JUNGSMANN, Altenburg
5. Funde, Aufzeichnungen und Sammlung von ERWIN NAUMANN, Altenburg

Hinweise und Angaben zur Arbeit und den Abkürzungen

Da in dieser Arbeit nur das Fangjahr (wenn bekannt) und nicht der Tag und Monat Bedeutung haben dürfte, wird auch nur das Jahr angegeben. In der Arbeit von RAPP und den Aufzeichnungen von TOTZAUER sind auch keine Häufigkeitsangaben vorhanden. Aus diesem Grunde werden auch bei den Nachweisen von JUNGSMANN und NAUMANN auf selbige verzichtet. Im Laufe der Jahre hat sich auch auf dem Gebiete der Nomenklatur manches geändert, so daß es bei einigen Arten durchaus vorkommen kann, daß Käfer, die bei RAPP und TOTZAUER angeführt

sind, auch heute noch vorkommen, allerdings unter anderem Namen. Wo die Möglichkeit besteht, die Namensänderung nachzuweisen, ist der gegenwärtig gültige angegeben. Das trifft auch für Käfer zu, die damals als Unterart oder Untergattung, neuerdings aber als selbständige Art oder Gattung angesprochen werden.

Verschiedentlich sind die neuen Bezeichnungen verwendet, um aber beim Nachschlagen in den Quellen nicht auf Unklarheit zu stoßen, ist der Name aus der Quelle unter „ehem.“ (ehemals) angegeben. Sind die alten Bezeichnungen noch geläufig, habe ich die neuen unter „neu“ mit angeführt.

Es ist auch nicht möglich, diese Faunenliste nach einer einheitlichen Systematik zu ordnen. Alle Coleopterologen wissen, daß seit REITTERS „Fauna Germanica“ noch keine umfassende einheitliche systematische Aufstellung herausgekommen ist. Laufende Neubearbeitungen von Familien und Gruppen stellten auch mich vor eine Entscheidung, die nicht einfach war. Aus diesem und manch anderem Grunde entschloß ich mich für folgende, systematische Ordnung:

1. Die Familien sind nach der Übersicht aus der „Exkursionsfauna von Deutschland“ von Prof. Dr. ERWIN STRESEMANN, Ausgabe 1964 geordnet.
2. Die Gattungen und Arten der Familien *Cicindelidae* und *Carabidae* sind nach der Systematik von Prof. Dr. FRIEDRICH DAHL in „Die Tierwelt Deutschlands ...“ Teil 7/I *Carabidae*, Gustav Fischer Verlag, Jena 1928, geordnet.
3. Die *Cerambycidae* und *Chrysomelidae* sind nach dem Band 9 „Die Käfer Mitteleuropas“ von FREUDE/HARDE/LOHSE systematisiert.
4. Für die Familie *Dermestidae* benutzte ich die Arbeit von M. MROCKOWSKI „Fauna Polski“, Warschau 1975.
5. Alle übrigen Familien sind nach dem System von REITTER „Fauna Germanica“ geordnet, da mir keine neueren Arbeiten zur Verfügung standen. Neue Bezeichnungen innerhalb der Familien wurden — soweit bekannt — berücksichtigt.

Jahreszahlen, die nach der Abkürzung des Autorennamens des zoologischen Namens vor dem waagerechten Strich stehen, weisen auf das Jahr der Beschreibung hin. Jahreszahlen nach dem Strich vor der Fundortangabe geben das Fundjahr an. In Klammern stehende Jahreszahlen weisen auf das Jahr der Erstveröffentlichung unterschiedlicher Autoren hin, die bei RAPP angegeben und nachzuschlagen sind. Ich halte die Jahresangabe für die Erstveröffentlichung bedeutungsvoll, weil teilweise kein Fundjahr angegeben ist. Denn dadurch kann festgestellt werden, daß das Fundjahr vorher gelegen haben muß.

Auf die genauen Fundortangaben wie Pflanzen u. ä. wird verzichtet, weil ohnehin darüber keine Vollständigkeit erzielt werden könnte, da bei RAPP und TOTZAUER diese Angaben fehlen. In den vorgesehenen Ergänzungsarbeiten ist beabsichtigt, genaue Angaben über Häufigkeit und Fundsubstrate aufzuzeichnen.

Abkürzungen:

R = Nachweis bei RAPP. Die dabeistehende römische Zahl gibt den Band und die arabische Zahl die Seite an. (R/I/18) = bei RAPP, Band I, Seite 18.

T = Handaufzeichnungen von FRANZ TOTZAUER. (T/15) = In TOTZAUERS Aufzeichnungen, Seite 15.

Sind in der Klammer zwei Zahlen angegeben, handelt es sich um die Systematische Sammlungsaufstellung von TOTZAUER. (T/3/7) = im 3. Buch der Systematischen Sammlungsaufstellung von TOTZAUER auf Seite 7.

(Die Aufzeichnungen TOTZAUERS befinden sich alle im Naturkundlichen Heimatmuseum „Mauritianum“ in Altenburg)

J = Von JUNGSMANN gefunden und in seiner eigenen Sammlung aufbewahrt

N = Von NAUMANN gefunden und in seiner eigenen Sammlung aufbewahrt

J/n = Von JUNGSMANN gefunden und in der Sammlung von NAUMANN aufbewahrt

Wa = Waldgebiet

Te = Teiche und Teichgebiet

Tü = Tümpel oder Pfützen

Ba = Wasserläufe jeder Art

ADEPHAGA

Familienreihe: *Caraboidea*

1. *Cicindelidae*

<i>Cicindela germanica</i> LIN. 1758	—	Leina Wa (R/I/3)
<i>Cicindela campestris</i> LIN. 1758	—	1959 Leina Wa (T/1)
	—	1957 Deutsches Holz Wa (N)
	—	1970 Deutsches Holz Wa (N)
<i>Cicindela silvicola</i> DEJ. 1822	—	Leina, Weg nach Altmörsitz (R/I/2)
<i>Cicindela hybrida</i> LIN. 1758	—	1949, 1952 Leina Sandgrube (T/1)
	—	1968, 1969 Pöppschen, alter Schacht (N)
	—	1969 Kammerforst Wa (N)

2. Carabidae

- Calosoma inquisitor* LIN. 1758 — Altenburg (R/I/5)
 — 1967 Leina Wa (J)
 — Leina Wa (T/1/7)
- Carabus coriaceus* LIN. 1758 — 1965 Altenburg (J)
- Carabus cancellatus* LLL. 1798 — 1967 Deutsches Holz Wa (N)
- Carabus granulatus* LIN. 1758 — 1969, 1970 Deutsches Holz Wa (N)
- Carabus auronitens* FABR. — 1905 Altenburg, Leina Wa (R/I/10)
 — 1960 Leina Wa (T/3)
 — 1961 Leina Wa (T/3)
- Carabus auratus* LIN. 1761 — 1950 Leina Wa (T/3)
 — 1967 Großröda (N)
- Carabus violaceus* LIN. 1758 — Leina Wa (R/I/8)
 — 1958 Leina Wa (T/3)
- Carabus glabratus* PAYK. 1790 — Altenburg (R/I/18)
- Carabus catenulatus* SCOP. 1763 — 1910 Leina Wa (T/3)
 (auch unter *C. problematicus*
 HBST. 1784 bekannt)
- Carabus nemoralis* MÜLL. 1764 — 1960 Leina Wa (T/4)
 — 1965 Altenburg Stadtwald (N)
 — 1966 Leina Wa (N) Altenburg (N)
 — 1970—1976 Altenburg Garten-
 anlage (N)
- Carabus hortensis* LIN. 1758 — 1868, 1895, 1905 Leina Wa
 (R/I/17)
 — 1962 Leina Wa (T/4)
 — 1966 Leina Wa (J)
 — 1969 Deutsches Holz Wa (N)
 — 1966 Leina Wa (N)
- Carabus silverstris* PANZ.
 (bei DAHL als var. von *Carabus*
concolor FABR. 1792 angegeben)
- Notiophilus pusillus* WATERH. 1833 — 1954 Leina Wa (T/5)
- Notiophilus biguttatus* FABR. 1779 — 1974 Altenburg (N)
- Loricera pilicornis* FABR. 1775 — 1968 Deutsches Holz Wa (N)
- Omophron limbatus* FABR. 1776 — 1949 Leina Tü (T/5)
- Clivina fessor* LIN. 1758 — 1949 Leina Wa (T/1/23)
- Dyschirius chaldeus* ER. 1837 — 1949 Leina Wa (T/1/23)
- Dyschirius politus* DEJ. 1825 — 1949 Leina Wa Tü (T/6)
- Dyschirius nitidus* DEJ. 1825 — Klausä Tü (R/I/30)
- Perileptus areolatus* CREUTZ 1799 — Breitingen Te (R/I/55)

- Asaphidion pallipes* DUFT. 1812 — 1974 Altenburg Gartenanl. (N)
Bembidion lampros HRBST. 1784 — 1969 Kammerforst Wa (N)
 neue Gattungsbezeichnung
Bembidium
Bembidium genei NET. 1914 — 1948 Leina Wa (T/8) (T/1/29)
Syn. B. quadriguttatum FABR. 1775
 (Da eine andere Art auch die Bezeichnung *B. quadriguttatum* OLIV. 1795 trägt, ist nicht nachweislich, ob diese Art nach FABR. oder OLIV. determiniert wurde)
Bembidium quinquestriatus — Altenburg, Kotteritz, Paditz
 GYLL. 1810 (R/I/53)
 (ehem. als *Ocys quinquestriatus* bekannt. Neuerdings ist *Ocys* Untergattung zu *Bembidium*)
Bembidium humerale STRM. 1825 — 1894 Kammerforst Wa (R/I/47)
 — 1905 Leina Wa, Klausä (R/I/47)
Bembidium minimum FABR. — 1932, 1949 Leina Wa (T/8)
 1775 (T/1/28)
 (ehem. *Emphanes minimum*)
Bembidium articulatum GYLLH. — 1949 Leina (T/1/29)
 1810
 (ehem. *Trepanes articulatum*)
Bembidium octomaculatum — 1905 Leina Lendeteiche (R/I/49)
 GOEZE 1777
Bembidium doris GYLLH. 1810 — Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/49)
 — Klausä Te (R/I/37)
Bembidium dentellum THUN. 1787
Bembidium obliquum STRM. 1825 — Leina Wa (R/I/38)
Bembidium tibiale DUFT. 1812 — 1943 Leina Spannerbach Ba (T/7)
Bembidium nitidulum MRSH. — Leina Wa (R/I/42)
 1802
 (ehem. *Peryphus nitidulum*) — 1949 Leina Wa (T/7) (T/1/28)
Bembidium rubestrem LIN. 1767 — 1952 Leina Spannerbach Ba (T/7)
 (ehem. *Peryphus rubestrem*) (T/1/27)
Trechus quadristriatus SCHRNK. — Paditz (R/I/57)
 1781
Dolichus halensis SCHALL. 1783 — Kotteritz (R/I/128)

- Agonum sexpunctatum* LIN. 1758 — 1970 Deutsches Holz Wa, Einzel-exemplar (N)
- Agonum assimilis* PAYK. 1790 — 1963 Leina Wa (T/n)
- (ehem. *Platynus assimilis*) — 1966 Deutsches Holz Wa (N)
- 1969 Deutsches Holz Wa (N)
- 1970—1976 Altenburg (N)
- Europhilus thoreyi* DEJ. 1828 — 1905 Windischleuba Te, Leina Fürstenteiche Te (R/I/137)
- (ehem. *Anchomenus thoreyi*)
- Europhilus gracilis* GYLL. 1827 — 1962 Leina Wa (T/n)
- (ehem. *Anchomenus gracilis*) — 1963 Niederwiera (T/n)
- Leina Fürstenteiche Te (R/I/137)
- Europhilus piceus* LIN. 1758 — 1905 Leina Wa (R/I/137)
- (ehem. *Anchomenus piceus*)
- Molops elatus* FABR. 1801 — 1968 Altenburg (N)
- Poecilus lepidus* LESK. 1785 — 1945 Leina Wa (T/17)
- (ehem. *Pterostichus lepidus*)
- Poecilus cupreus* LIN. 1758 — 1968 Pöppschen (N)
- 1969 Deutsches Holz Wa (N)
- 1970 Deutsches Holz Wa (N)
- 1970 Altenburg (N)
- 1969 Deutsches Holz Wa (N)
- Poecilus coerulescens* LIN. 1758 — 1969 Deutsches Holz Wa (N)
- Pterostichus anthracinus* ILL. 1798 — Leina Wa (R/I/110)
- Pterostichus minor* GYLL. 1827 — Windischleuba Te (R/I/120)
- Pterostichus gracilis* DEJ. 1828 — Leina Wa (R/I/119)
- Pterostichus oblongopunctatus* FABR. 1787 — 1968 Deutsches Holz Wa (N)
- 1969 Deutsches Holz Wa (N)
- Pterostichus burmeisteri* HEER — 1958 Leina Wa (T/18)
- 1940 Leina Wa (T/1/50)
- Pterostichus vulgaris* LIN. 1758 — 1970 Deutsches Holz Wa (N)
- Pterostichus vernalis* PANZ. 1796 — 1949 Leina Wa (T/17) (T/1/48)
- (ehem. *Lagerus vernalis*)
- Pterostichus diligens* STRM. 1924 — Windischleuba Te (R/I/121)
- Abax parallelus* DUFT. 1812 — 1969 Altenburg (N)
- Abax ovalis* DUFT. 1812 — Leina Wa (R/I/110)
- 1951 Leina Wa (T/1/46)
- Amara plebeja* GYLL. 1810 — Klausa, Leina Wa (R/I/95)
- 1967 Altenburg Einzelexempl. (N)
- Amara bifrons* GYLL. 1810 — Leina (R/I/103)
- Amara similata* GYLL. 1810 — 1967 Altenburg (N)
- 1974 Leina Wa, Altenburg (N)
- Amara ingenua* DUFT. 1812 — Altenburg (R/I/102)

<i>Amara fusca</i> DEJ. 1828	— 1902 Leina Wa (R/I/102)
<i>Amara communis</i> PANZ. 1779	— 1967 Altenburg (N)
	— 1974 Altenburg (N)
<i>Amara curta</i> DEJ. 1828	— Leina (R/I/99)
<i>Amara familiaris</i> DUFT. 1812	— 1967 Starkenberg (N)
	— 1968 Deutsches Holz Wa (N)
	— 1974 Leina Wa, Altenburg (N)
<i>Ophonus punctulatus</i> DUFT. 1812	— Münsaer Linden, Weg nach Paditz (R/I/70)
<i>Pseudophonus pubescens</i> MÜLL. 1776	— 1968 Altenburg (N)
<i>Harpalus aeneus</i> FABR. 1775	— 1966 Altenburg Stadtwald (N)
	— 1966 Altenburg Hellwiese (N)
<i>Harpalus luteicornis</i> DUFT. 1812	— 1905 Leina Wa (R/I/78)
<i>Stenolophus mixtus</i> HRBST. 1784	— Windischleuba Te (R/I/86)
<i>Stenolophus teutopus</i> SCHRNK. 1781	— 1905 Leina Wa (R/I/85)
	— 1953 Leina Wa (T/13) (T/1/40)
<i>Stenolophus discophorus</i> FISCH. (bei DAHL nicht verzeichnet)	— 1878, 1902 Breitingen Te (R/I/85)
<i>Acupalpus exiguus</i> DEJ. 1829	— Leina Lendeteiche (R/I/88)
<i>Acupalpus dorsalis</i> FABR. 1787	— 1905 Leina Heede-Eichen, Windischleuba Te (R/I/88)
<i>Acupalpus elegans</i> DEJ. 1829	— 1968 Altenburg, Einzelexempl. (N)
<i>Acupalpus flavicollis</i> STRM. 1825	— 1957 Leina Wa (T/1/41)
<i>Balius consputus</i> DUFT. 1812 (ehem. <i>Anthracus consputus</i>)	— 1943 Leina Wa (T/13) (T/1/41)
<i>Anthracus flavicollis</i> (Anthracus ist Syn. für Balius. In dieser Gattung ist die Art <i>flavicollis</i> nicht verzeichnet. Es könnte <i>Balius longicornis</i> oder <i>Acupalpus flavicollis</i> gemeint sein)	— 1957 Leina Wa (T/13)

3. Hygrobiidae

Keine Vorkommen nachgewiesen

4. Haliplidae

<i>Brychius elevatus</i> PANZ.	— 1840 Altendorf Te (R/I/153)
<i>Halipilus obliquus</i> FABR.	— 1840 Altendorf Te, Te zwischen

(ehem. <i>H. amoenus</i> OLIV.)		Oberlödla und Zschernitzsch (R/I/154)
<i>Haliplus confinis</i> STEPH.	— 1835	Te zwischen Oberlödla und Zschernitzsch (R/I/154)
<i>Haliplus fulvus</i> FABR.	—	Altendorf Te
	— 1840	Te zwischen Oberlödla und Grüntal, Wilchwitz Te, Windischleuba Te (R/I/155)
<i>Haliplus variegatus</i> STRM.	— 1840	Oberlödla Te (R/I/154)
<i>Haliplus flavicollis</i> STRM.	— 1840	Zwischen Oberlödla und Grüntal Te, Windischleuba Te (R/I/155)
<i>Haliplus laminatus</i> SCHALL.	— 1840	Altendorf Te, Mückernscher Grund Te, zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Te, zwischen Oberlödla u. Grüntal Te (R/I/156)
<i>Haliplus fulvicollis</i> ER.	—	Leina Blaue Quelle (R/I/157)
<i>Haliplus ruficollis</i> DEG.	— (1840)	Altenburg (R/I/156)
<i>Haliplus immaculatus</i> GERH.	—	Altenburg (R/I/158)
<i>Haliplus lineatocollis</i> MRSH.	— (1840)	Altendorf Ratsteich, Wilchwitz Te, zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Te, Drescha Te (R/I/158)
<i>Cnemidotus impressus</i> PANZ.	—	Altendorf Te
(ehem. <i>C. caesus</i> DUFT.)	— (1840)	Wilchwitz Te, zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Te, Drescha Te, Oberlödla Te (R/I/159)

5. Dytiscidae

<i>Hyphydrus ovatus</i> LIN.	— 1834	Münsa Te (R/I/160)
(ehem. <i>H. ferrugineus</i> LIN.)	— 1949	Leina Wa (T/n)
	— 1949	Spannerbach u. Katzbach i. d. Leina Ba
	— 1962	Leina (T/n)
<i>Hygrotus versicolor</i> SCHALL.	— (1840)	Altendorf Te, Oberlödla Te, Zschernitzsch Te, Drescha Te, Steinwitz Ba (R/I/161)
<i>Hygrotus inaequalis</i> FABR.	—	Altenburg (R/I/160)

- Hygrotus impressopunctatus* SCHALL. — 1966. Windischleuba Schloßteich (N)
- Coelambus confluens* FABR. — (1840) Altenburg Tü, Oberlödla Te (R/I/163)
- (auch als Untergattung zu *Hygrotus*)
- Bidessus unistriatus* ILL. — (1840) Altendorf Te, Teiche bei Oberlödla, Zschernitzsch u. Grüntal (R/I/163)
- Bidessus geminus* FABR. — (1840) Altenburg (R/I/164)
- Hydroporus pictus* FABR. — 1959 Leina Wa (T/28)
— 1962, Leina Wa (T/28)
- Hydroporus bilineatus* STRM. — (1840) Altendorf Te, Untermünsa Te, Oberlödla Te, zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Te (R/I/167)
- Hydroporus granularis* LIN. — (1840) Altendorf Te, Untermünsa Te (R/I/167)
- Hydroporus lineatus* DEG. — Altenburg (R/I/168)
- Hydroporus palustris* LIN. — (1840) Altenburg Te (R/I/171)
- Hydroporus umbrosus* GYLL. — Altenburg (R/I/172)
- Hydroporus angustatus* STRM. — (1838) zwischen Oberlödla u. Grüntal Te (R/I/170)
- Hydroporus tristis* PAYK. — (1840) zwischen Oberlödla u. Grüntal Te, Drescha Te (R/I/172)
- Hydroporus obscurus* STRM. — Leina Fürstenquelle (R/I/173)
- Hydroporus erythrocephalus* LIN. — (1840) Altendorf, Mückernscher Grund Te, Knauscher Grund Tü, zwischen Oberlödla und Grüntal Te, Oberlödlaer Holz Te, Rasephaser Schanzen Ba (R/I/169)
- Hydroporus planus* FABR. — (1840) Leina Blaue und Fürstenquelle (R/I/173)
- Hydroporus pubescens* GYLL. — Fürstenquelle Leina (R/I/174)
- Hydroporus nigrita* FABR. — (1840) Altendorf Te, Mückernscher Grund Te, zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Te, Leina Spannerbach Ba, Blaue u. Fürstenquelle Ba, Leina Tü (R/I/175)

<i>Hydroporus memnonius</i> NIC.	—	Leina Fürsten- und Blaue Quelle Ba (R/I/175)
<i>Hydroporus melanarius</i> STRM.	—	Leina Kalte Quelle Ba (R/I/176)
<i>Noterus clavicornis</i> DEG.	— (1840)	zwischen Oberlödla u. Grüntal Te, Wilchwitz Te, Oberlödla Te (R/I/177)
<i>Noterus crassicornis</i> MÜLL.	— (1840)	zwischen Oberlödla u. Grüntal Te, Wilchwitz Te, Oberlödla Te (R/I/176)
	— 1966	Windischleuba Schloßteich (N)
<i>Laccophilus variegatus</i> GERM.	— 1838	Oberlödla Te (R/I/177)
<i>Laccophilus obscurus</i> PANZ.	— (1840)	Altenburg Te (R/I/178)
<i>Laccophilus virescens</i> BRAHM (bei REITTER unter dieser Gattung nicht angegeben)	— (1840)	Altenburg Te (R/I/178)
<i>Agabus bipustulatus</i> LIN.	— (1840)	Leina Blaue Quelle Ba, Altenburg Te (R/I/180)
	— 1967	Leina Wa (N)
<i>Agabus melanarius</i> AUB.	— (1886)	Leina Blaue Quelle Ba (R/I/180)
<i>Agabus sturmi</i> GYLL.	— (1840)	Altendorf Te, Ba, Mückerscher Grund Te, Knausches Holz Tü, zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Ba, Leina Fürstenquelle Ba (R/I/184)
<i>Agabus nebulosus</i> FORST.	—	Altendorf Te
	— (1840)	Oberlödlaer Holz Te, Leina Fürstenquelle Ba (R/I/183)
<i>Agabus didymus</i> OLIV.	— (1840)	zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Te (R/I/178)
<i>Agabus guttatus</i> PAYK.	—	Leina Blaue Quelle Ba (R/I/179)
<i>Agabus undulatus</i> SCHRNK.	— (1840)	Altenburg (R/I/185)
	— 1960	Leina Spannerbach Ba (T/29)
	— 1966	Windischleuba Schafteich (N)
	— 1930	Leina Spannerbach Ba (T/2/9)
<i>Agabus affinis</i> PAYK.	— (1840)	Oberlödla Te (R/I/183)

- Agabus chalconatus* PANZ. — (1840) Spannerbach Ba, Mückernscher Grund Te, zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Te, Leina Blaue und Fürstenquelle Ba (R/I/181)
- Agabus uliginosus* LIN. — 1834 Mückernscher Grund Te (R/I/182)
- Agabus paludosus* FABR. — (1840) Altendorf Te, Mückernscher Grund Te, Knausches Holz Tü, zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Te, Ba, Leina Blaue u. Fürstenquelle Ba (R/I/182)
- Agabus congener* PAYK. — 1834 Mückernscher Grund Te (R/I/183)
- Agabus subtilis* ER.
(diese Art bei REITTER nicht angegeben) — (1886) Knausches Holz Tü, Leina Blaue u. Fürstenquelle Ba (R/I/181)
- Platambus maculatus* LIN. — (1840) Grüntal Ba (R/I/185)
- Ilybius fuliginosus* FABR. — (1840) Altenburg (R/I/187)
- 1949 Leina Tü (T/30)
- Ilybius obscurus* MRSH. — Altenburg (R/I/188)
- 1967 Windischleuba Schloßteich (N)
- Ilybius ater* DEG. — (1840) Leina Fürstenquelle Ba (R/I/188)
- Ilybius fenestratus* FABR. — (1840) Altenburg (R/I/187)
- Copelatus ruficollis* SCHALL. — (1840) Wilchwitz Te, Oberlödla Te (R/I/186)
- Nartus grapi* MRSH.
(bei REITTER *Rhantus grapi* GYLL.) — (1840) Drescha Te, Untermünsa Te (R/I/189)
- Rhantus punctatus* GEOFFR. — (1840) zwischen Oberlödla u. Zschernitzsch Ba (R/I/190)
- 1967 Zschaschelwitz Straßenteich (N)
- 1967 Windischleuba Schloßteich (N)
- Rhantus notatus* FABR. — (1840) Untermünsa Te (R/I/190)
- 1967 Windischleuba Schafteich (N)
- Rhantus adspersus* FABR. — (1840) Untermünsa Te (R/I/191)
- Rhantus exoletus* FORST. — (1840) Altenburg (R/I/192)

- Colymbetes fuscus* LIN. — 1966 Windischleuba Schloßteich (N)
- Hydaticus seminiger* DEG. — (1840) Wilchwitz Te, Oberlödla Te, Ratsteiche (Altendorf?) (R/I/192)
- Hydaticus stagnalis* FABR. — 1967 Windischleuba Te (N)
- Ratsteich (Altendorf?),
- (1840) Wichwitz Te (R/I/193)
- (1840) zwischen Oberlödla u. Grün-
tal Te, Untermülsa Te
(R/I/193)
- Hydaticus transversalis* PONT. — (1840) zwischen Oberlödla u.
Zschernitzsch Te, zwischen
Oberlödla u. Grün-
tal Te, Ratsteiche, Wilchwitz Te
(R/I/197)
- Graphoderes bilineatus* DEG. — (1840) Oberlödla Te, zwischen Ober-
lödla u. Grün-
tal Te, Alten-
dorf Te, Ba, Drescha Te,
Windischleuba Te (R/I/194)
- Graphoderes zonatus* HOPP. — (1840) zwischen Oberlödla u. Grün-
tal Te, Oberlödla Te
(R/I/195)
- Graphoderes cinereus* LIN. — (1840) Altenburg (R/I/194)
- 1966 Windischleuba Schafteich
(N)
- Graphoderes austriacus* STRM. — (1840) zwischen Oberlödla u.
Zschernitzsch Te, Unter-
mülsa Te (R/I/194)
- Acilius sulcatus* LIN. — (1840) Altenburg (R/I/195)
- 1966 Windischleuba Schafteiche
(N)
- Acilius canaliculatus* NICOL. — (1840) zwischen Oberlödla u. Grün-
tal Te, Oberlödla Te
(R/I/195)
- Dytiscus latissimus* LIN. — (1840) Windischleuba Te (R/I/196)
- Dytiscus punctulatus* FABR. — (1840) Nobitz Te, Altendorf Rats-
teich (R/I/197)
- Dytiscus dimidiatus* BERGST. — (1840) Windischleuba Te (R/I/197)
- Dytiscus marginalis* LIN. — (1840) zwischen Oberlödla u.
Zschernitzsch Te (R/I/196)
- Dytiscus circumcinctus* AHR. — (1840) Windischleuba Te, Wilch-
witz Te (R/I/198)

- Dytiscus circumflexus* FABR. — (1840) Windischleuba Te (R/I/198)
Cybister laterimarginalis DEG. — (1840) Oberlödla Te, Wilchwitz Te
 (R/I/198)

6. *Gyrinidae*

- Gyrinus minutus* FABR. — Altenburg (R/I/199)
Gyrinus marinus GYLL. — (1840) Drescha Deutscher Bach
 (R/I/200)
Gyrinus paykulli — Wilchwitz Te (R/I/199)
 (Die einzige Art *paykulli* ER. ist unter der Gattung *Colymbetes* bekannt, so daß es sich um einen Käfer handeln dürfte, der als *Colymbetes paykulli* anzusprechen ist)
Orectochilus villosus MÜLL. — (1840) Blaue Flut bei Altendorf Ba, Sprotte bei Burkersdorf Ba
 (R/I/201)

POLYPHAGA

Familienreihe: *Staphylinoidea*

7. *Hydraenidae*

- (Die Familie *Hydraenidae* ist bei REITTER in die Familienreihe *Palpicornia* eingereiht (Band II, Seite 346) und als Unterfamilie *Hydraeninae* der Familie *Hydrophilidae* zugeordnet (Band II, Seite 350))
Hydraena riparia KUG. — Leina Tü (R/I/609)

8. *Sphaeriidae*

Keine Vorkommen nachgewiesen

9. *Ptiliidae*

(ehem. *Trichopterygidae*)

- Ptenidium gressneri* ER. — 1886 Leina Wa (R/I/567)
Ptenidium pusillum GYLL. — 1848 (1851) Altenburg (R/I/568)

<i>Ptenidium punctatum</i> GYLL.	—	1845 (1851) Altenburg (R/I/569)
<i>Ptilium exaratum</i> ALLIB.	—	1843 (1851) Altenburg (R/I/571)
<i>Ptiliolum kunzei</i> HEER. (oder <i>Ptiliolum</i>)	—	1845 (1851) Altenburg (R/I/570)
<i>Ptiliolum spenzei</i> ALLIB.	—	1845 (1851) Altenburg (R/I/570)
<i>Euryptilium saxonicum</i> GILLM.	—	(1908) Altenburg (R/I/569)
	—	1843 (1851) Rasphas (R/I/569)
<i>Ptinella tenella</i> ER.	—	Leina Wa (R/I/571)
<i>Nephanes titan</i> NEWM.	—	(1852) Altenburg (R/I/573)
<i>Acrotrichis grandicollis</i> MANNH. (ehem. <i>Trichopteryx</i>)	—	(1851) Altenburg (R/I/574)
<i>Acrotrichis montandoni</i> ALLIB.	—	(1845) Altenburg (R/I/574)
<i>Acrotrichis chevrolati</i> ALLIB.	—	(1845) Altenburg (R/I/577)
<i>Acrotrichis thoracica</i> WALT.	—	(1845) Altenburg (R/I/574)
<i>Acrotrichis atomaria</i> DEG.	—	(1845) Windischleuba (R/I/575)
<i>Acrotrichis intermedia</i> GILLM.	—	(1845) Altenburg (R/I/575)
<i>Acrotrichis fascicularis</i> HRBST.	—	Leina Wa, Windischleuba (R/I/576)
<i>Acrotrichis brevipennis</i> ER.	—	(1845) Altenburg (R/I/576)
<i>Acrotrichis sericans</i> HEER	—	(1845) Altenburg (R/I/577)

10. Catopidae

(Bei REITTER als Unterfamilie *Cholevinae* der Familie *Silphidae* zugeordnet (Band II, Seite 230))

<i>Choleva oblonga</i> LATR.	—	Altenburg, Leina, Paditz (R/I/518)
<i>Choleva cisteloides</i> FRÖL.	—	Paditz (R/I/519)
<i>Choleva agilis</i> ILLIG.	—	Altenburg, Lossen, Paditz (R/I/520)
<i>Nargus wilkini</i> SPENC.	—	(1852) Altenburg (R/I/521)
<i>Nargus anisotomoides</i> SPENC.	—	Lossen (R/I/522)
<i>Catops fumatus</i> SPENC.	—	Leina Wa (R/I/523)
<i>Catops watsoni</i> SPENC.	—	Paditz (R/I/523)
<i>Catops fuscus</i> PANZ.	—	Paditz (R/I/525)
	—	1959 Leina (T/50)
<i>Catops nigricans</i> SPENC.	—	Leina, Paditz (R/I/525)
<i>Catops nigrita</i> ER.	—	Paditz (R/I/527)
<i>Catops morio</i> FABR.	—	Leina (R/I/528)
<i>Catops neglectus</i> KR.	—	Lossen (R/I/528)
<i>Catops kirbyi</i> SPENC.	—	Altenburg (R/I/528)
<i>Catops chrysomeloides</i> PANZ.	—	Paditz (R/I/529)

<i>Catops alpinus</i> GYLL.	—	Paditz (R/I/524)
<i>Ptomaphagus subvillosus</i> GOEZE	—	Paditz (R/I/531)
(bei REITTER nicht verzeichnet)		

11. *Colonidae*

(Bei REITTER der Familie *Silphidae*, Tribus *Colonini* (Band II, Seite 235) zugeordnet)

<i>Colon rufescens</i> KR.	—	1885 (1902) Paditz (R/I/533)
<i>Colon clavigerum</i> HRBST.	—	Paditz (R/I/532)
<i>Colon affine</i> STRM.	—	(1902) Paditz (R/I/532)
<i>Colon dentipes</i> SAHLBG.	—	Paditz (R/I/533)
<i>Colon brunneum</i> LATR.	—	Leina, Paditz (R/I/534)

12. *Liodidae*

(Bei REITTER als Unterfamilie *Liodinae* der Familie *Silphidae* zugeordnet (Band II, Seite 246))

<i>Liodes dubia</i> KUG.	—	Paditz (R/I/550)
<i>Liodes flavescens</i> SCHMIDT	—	Paditz (R/I/551)
<i>Liodes obesa</i> SCHMIDT	—	Paditz (R/I/551)
<i>Colenis immunda</i> STRM.	—	Paditz (R/I/555)
<i>Cyrtusa sublestacea</i> GYLL.	—	Paditz (R/I/555)
<i>Cyrtusa pauxilla</i> SCHMIDT	—	Paditz (R/I/555)
<i>Cyrtusa minuta</i> AHR.	—	Paditz (R/I/555)
<i>Anisotoma orbicularis</i> HRBST.	—	Paditz (R/I/557)
<i>Amphicyllis globus</i> FABR.	—	Paditz (R/I/558)
<i>Amphicyllis globiformis</i> SAHLBG.	—	Leina Wa (R/I/558)
<i>Agathidium seminulum</i> LIN.	—	Paditz (R/I/560)
	—	Leina Wa, Klaus (R/I/560)
<i>Agathidium marginatum</i> STRM.	—	Leina Wa (R/I/561)

13. *Leptinidae*

Keine Vorkommen nachgewiesen

14. *Clambidae*

<i>Clambus minutus</i> STRM.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/563)
<i>Clambus punctulum</i> BOCK.	—	Leina Wa, Windischleuba Te (R/I/563)

<i>Clambus pubescens</i> REDTB.	—	Paditz (R/I/565)
<i>Clambus armadillo</i> DEG.	—	Paditz (R/I/564)

15. *Scaphidiidae*

<i>Scaphosoma agaricinum</i> LIN.	—	1963 Leina Wa (T/53)
-----------------------------------	---	----------------------

16. *Silphidae*

<i>Necrophorus germanicus</i> LIN.	—	1924 Leina Wa, Kammerforst Wa (T/50)
<i>Necrophorus humator</i> FABR.	—	1958 Leina Wa, Kammerforst Wa (T/50)
	—	1961 Leina Wa (T/50)
	—	1969 Deutsches Holz Wa (N)
	—	1976 Lödla Wa (N)
<i>Necrophorus fossor</i> ER.	—	Altenburg, Paditz (R/I/536)
(<i>chem. N. interruptus</i> STEPH.)	—	1965 Altenburg (N)
	—	1969 Altenburg (N)
	—	1976 Lödla (N)
<i>Necrophorus investigator</i> ZETTST.	—	1976 Lödla (N)
<i>Necrophorus sepultor</i> CHARP.	—	Leina Wa (R/I/537)
<i>Necrophorus vespilloides</i> HRBST.	—	1968 Deutsches Holz Wa (N)
	—	1969 Deutsches Holz Wa (N)
	—	1976 Lödla Wa (N)
<i>Necrophorus vespillo</i> LIN.	—	Altenburg, Paditz (R/I/538)
	—	1969 Altenburg, Deutsches Holz Wa (N)
	—	1976 Lödla Wa (N)
<i>Oeceoptoma thoracia</i> LIN.	—	1969 Deutsches Holz Wa (N)
<i>Blitophage opaca</i> LIN.	—	Altenburg (R/I/541)
	—	1974 Leina Wa (N)
<i>Phosphuga atrata</i> LIN.	—	1969 Deutsches Holz Wa (N)
	—	1969 Pahna Wa (N)
<i>Agyrtes castaneus</i> FABR.	—	Leina Wa, Paditzer Schanzen, Altenburg (R/I/546)
<i>Anisotoma humeralis</i> FABR.	—	1967 Leina Wa (T/n)
	—	Paditz, Leina Wa (R/I/556)
<i>Anisostoma castanea</i> HRBST.	—	1961 Leina Wa (T/53)
	—	Paditz (R/I/557)

17. *Scydmaenidae*

<i>Neuraphes rubicundus</i> SCHAUM.	—	Leina Wa (R/I/512)
<i>Neuraphes elongatulus</i> MÜLL.	—	Leina Wa (R/I/512)
<i>Stenichnus scutellaris</i> MÜLL.	—	Leina Wa (R/I/513)
<i>Stenichnus collaris</i> MÜLL.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/514)
<i>Stenichnus pusillus</i> MÜLL.	—	Leina Wa (R/I/514)
<i>Euconnus hirticollis</i> ILLIG.	—	Leina Lendeteiche Te, Windischleuba Te (R/I/516)
<i>Scydmaenus tarsatus</i> MÜLL.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/517)
<i>Scydmaenus hellwigi</i> HRBST.	— 1883	(1902) Leina Wa (R/I/518)

18. *Staphylinidae*

<i>Ocalea badia</i> ER.	—	Lossen, Leina Wa, Münsa Pleißeufer (R/I/466)
<i>Ocalea picata</i> STEPH.	—	Leina Wa (R/I/467)
<i>Calodera aethiops</i> GRAY.	—	Leina Lendeteiche (R/I/464)
<i>Chilopora longitarsis</i> ER.	—	Windischleuba Te, Paditz (R/I/465)
	— 1949	Leina Wa (T/48)
<i>Phloeopora testacea</i> MANNH.	—	Leina Wa (R/I/461)
<i>Phloeopora corticalis</i> GRAY.	—	Leina Wa, Oberlödla Wa (R/I/462)
<i>Aleochara curtula</i> GOEZE	— 1950	Leina Wa (T/49)
<i>Aleochara intricata</i> MANNH.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/486)
<i>Aleochara tristis</i> GRAY.	— (1902)	Nobitz (R/I/487)
<i>Aleochara moesta</i> GRAY.	—	Leina Wa (R/I/487)
<i>Aleochara sparsa</i> HEER	—	Paditz (R/I/488)
<i>Aleochara villosa</i> MANNH.	— (1902)	Altenburg, Paditz (R/I/490)
<i>Aleochara lanuginosa</i> GRAY.	—	Paditz (R/I/489)
<i>Aleochara sanguinea</i> LIN.	—	Lendeteiche, Paditz (R/I/490)
<i>Aleochara fumata</i> GRAY.	—	Paditz (R/I/491)
<i>Aleochara moerens</i> GYLL.	—	Leina Wa, Lossen (R/I/491)
<i>Aleochara spadicea</i> ER.	—	Altenburg (R/I/492)
<i>Aleochara bilineata</i> GYLL.	—	Windischleuba Te (R/I/493)
<i>Aleochara verna</i> SAY.	— (1906)	Kammerforst Wa (R/I/494)
<i>Microglossa pulla</i> GYLL.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/481)
<i>Microglossa gentilis</i> MAERK.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/482)
<i>Microglossa marginalis</i> GRAY.	—	Altenburg (R/I/482)
<i>Ocyusa maura</i> ER.	—	Lendeteiche (R/I/467)

<i>Strichoglossa semirufa</i> ER.	—	Kammerforst Wa (R/I/479)
<i>Strichoglossa prolixa</i> GRAV. (bei REITTER zur Gattung <i>Ischnoglossa</i> KR.)	—	Leina Wa (R/I/480)
<i>Strichoglossa corticina</i> ER. (bei REITTER zur Gattung <i>Dexiogyia</i> THMS.)	—	Altenburg (R/I/479)
<i>Oxypoda spectabilis</i> MAERK.	—	Leina Wa (R/I/468)
<i>Oxypoda lividipennis</i> MANNH.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/469)
<i>Oxypoda vittata</i> MAERK.	—	Leina Wa (R/I/470)
<i>Oxypoda longipes</i> REY.	—	Altenburg (R/I/470)
<i>Oxypoda opaca</i> GRAV.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/469)
<i>Oxypoda vicina</i> KR.	— (1886)	Altenburg (R/I/471)
<i>Oxypoda umbrata</i> GYLL.	—	Paditz (R/I/472)
<i>Oxypoda amoena</i> FAIRM.	—	Altenburg (R/I/476)
<i>Oxypoda planipennis</i> THOMS.	— (1886)	Altenburg (R/I/475)
	— (1902)	Leina Wa (R/I/475)
<i>Oxypoda annularis</i> MANNH.	—	Altenburg (R/I/478)
<i>Lomechusa strumosa</i> GRAV.	—	Kammerforst Wa (R/I/460)
<i>Zyras fulgidus</i> GRAV. (auch <i>Z. fulgida</i>)	— (1902)	1889 Leina Wa (R/I/456)
<i>Zyras collaris</i> PAYK.	—	Leina Wa, Windischleuba (R/I/456)
<i>Zyras funestus</i> GRAV. (ehem. <i>Myrmedonia funesta</i>)	—	Leina Wa (R/I/457)
<i>Zyras humeralis</i> GRAV. (ehem. <i>Myrmedonia humeralis</i> GRAV.)	—	Lendeteiche (R/I/457)
<i>Zyras cognatus</i> MAERK. (ehem. <i>Myrmedonia cognata</i>)	—	Lendeteiche (R/I/457)
<i>Zyras limbatus</i> PAYK. (ehem. <i>Myrmedonia limbata</i>)	—	Lendeteiche (R/I/458)
<i>Zyras lugens</i> GRAV. (ehem. <i>Myrmedonia lugens</i>)	—	Leina Wa, Paditz (R/I/459)
<i>Zyras laticollis</i> MAERK. (ehem. <i>Myrmedonia laticollis</i>)	—	Leina Wa (R/I/459)
<i>Notohecta flavipes</i> GRAV.	—	Leina Wa (R/I/453)
<i>Notohecta confusa</i> MAERK.	—	Leina Wa (R/I/455)
<i>Thamiaraea cinnamomea</i> GRAV.	—	Leina Wa (R/I/455)
<i>Thamiaraea hospida</i> MAERK.	—	Leina Wa (R/I/455)
<i>Atheta incana</i> ER.	—	Lendeteiche, Haselbach Te, Windischleuba (R/I/419)
<i>Atheta brunnea</i> FABR.	—	Paditz (R/I/420)

<i>Atheta analis</i> GRAV.	—	Leina Wa (R/I/450)
<i>Atheta gregaria</i> ER.	—	(1886) Paditz, Windischleuba Te (R/I/410)
<i>Atheta insecta</i> THOMS.	—	Paditz (R/I/412)
<i>Atheta linearis</i> GRAV.	—	Paditz (R/I/419)
<i>Atheta angustula</i> GYLL.	—	Paditz (R/I/418)
<i>Atheta aequata</i> ER.	—	Altenburg (R/I/418)
<i>Atheta subtilis</i> SCRIB.	—	Leina Wa (R/I/425)
<i>Atheta amicula</i> STEPH.	—	Altenburg (R/I/425)
<i>Atheta palleola</i> ER.	—	Leina Wa (R/I/426)
<i>Atheta ravilla</i> ER.	—	Windischleuba Te (R/I/422)
<i>Atheta palustris</i> KIESW.	—	Leina Wa, Paditz, Zschemnitzsch (R/I/423)
<i>Atheta angusticollis</i> THOMS.	—	(1902) Leina Wa (R/I/422)
<i>Atheta picipes</i> THOMS.	—	Leina Wa (R/I/422)
<i>Atheta procera</i> KR.	—	Leina Wa bei Klausä (R/I/423)
<i>Atheta crassicornis</i> FABR.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/432)
<i>Atheta pilicornis</i> THOMS.	—	Leina Wa, Klausä, Paditz (R/I/432)
<i>Atheta trinotata</i> KR.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/433)
<i>Atheta nitidicollis</i> FAIRM.	—	Rasephaser Schanzen (R/I/431)
<i>Atheta triangulum</i> KR.	—	1894 Altenburg (R/I/434)
<i>Atheta sodalis</i> ER.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/434)
<i>Atheta myrmecobia</i> KR.	—	Leina Wa (R/I/430)
<i>Atheta coriaris</i> KR. (auch <i>A. coraria</i>)	—	Leina Wa, Kammerforst Wa (R/I/430)
<i>Atheta coriaris</i> KR.	—	Leina Wa, Wilchwitz Te (R/I/429)
<i>Atheta gagatina</i> BAUDI.	—	Leina Wa (R/I/429)
<i>Atheta divisa</i> MAERK.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/428)
<i>Atheta oblita</i> ER.	—	Leina Wa, Rasephaser Schanzen, Wilchwitz Te (R/I/429)
<i>Atheta granigera</i> KIESW.	—	Windischleuba Te (R/I/436)
<i>Atheta nitidula</i> KR.	—	Leina Wa, Lossen, Paditz (R/I/436)
<i>Atheta hypnorum</i> KIESW.	—	Altenburg (R/I/435)
<i>Atheta gemina</i> ER.	—	Leina Wa (R/I/416)
<i>Atheta aubei</i> BRIS.	—	Leina Wa, Lendeteiche (R/I/415)
<i>Atheta hygrotopora</i> KR.	—	Paditz (R/I/415)

<i>Atheta luridipennis</i> MANNH.	—	Leina Wa, Paditz, Zschernitzsch (R/I/413)
<i>Atheta elongatula</i> GRAV.	—	Rasephaser Schanzen, Paditz, Windischleuba Te (R/I/415)
<i>Atheta melanocera</i> THOMS.	—	Leina Wa Lendeteiche, Wilchwitz Te, Windisch- leuba Te (R/I/414)
<i>Atheta terminalis</i> GRAV.	—	Leina Wa Lendeteiche (R/I/413)
<i>Atheta gyllenhali</i> GRAV.	— 1881	(1902) Leina Wa Lende- teiche (R/I/413)
<i>Atheta luteipes</i> ER.	—	Leina Fürstenquelle Ba (R/I/410)
<i>Atheta zosteræ</i> THOMS.	—	Klausä Te, Leina Wa, Paditz (R/I/444)
<i>Gnypeta carbonaria</i> MANNH.	—	Windischleuba (R/I/406)
<i>Brachyusa concolor</i> ER.	— (1851)	Altenburg (R/I/407)
<i>Tachyusa atra</i> GRAV. (bei REITTER der Gattung <i>Ischnopoda</i> zugeordnet)	—	Leina Fürstenquelle u. Lendeteiche, Paditz (R/I/404)
<i>Tachyusa umbratica</i> ER. (wie vorstehend)	—	Paditz (R/I/405)
<i>Tachyusa scitula</i> ER. (wie vorstehend)	—	Windischleuba Te (R/I/405)
<i>Falagria sulcata</i> PAYK.	—	Altenburg (R/I/402)
<i>Falagria thoracica</i> CURT.	—	Altenburg (R/I/402)
<i>Silusa rubiginosa</i> ER.	—	Leina Wa (R/I/397)
<i>Silusa rubra</i> ER.	— (1881)	Leina Wa, Lossen (R/I/397)
<i>Euryusa sinuata</i> ER.	— (1906)	Kammerforst Wa (R/I/399)
<i>Euryusa optabilis</i> HEER	—	Leina Wa (R/I/399)
<i>Euryusa castanoptera</i> KR.	— (1902)	1884 Leina Wa (R/I/399)
<i>Leptusa ruficollis</i> ER.	—	Leina Wa (R/I/398)
<i>Homalota plana</i> GYLL.	— (1913)	Kammerforst Wa (R/I/397)
<i>Thectura cuspidata</i> ER.	—	Leina Wa (R/I/396)
<i>Placusa pumilio</i> GRAV.	—	Leina Wa (R/I/396)
<i>Placusa atrata</i> SAHLBG.	— 1907	Kammerforst Wa (R/I/396)
<i>Gryphaena pulchella</i> HEER	—	Leina Wa (R/I/392)
<i>Gryphaena affinis</i> SAHLBG.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/392)
<i>Gryphaena gentilis</i> ER.	— (1902)	Leina Wa (R/I/393)
<i>Gryphaena nana</i> PAYK.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/392)
<i>Gryphaena fasciata</i> MRSH.	—	Leina Wa, Lossen (R/I/393)
<i>Gryphaena minima</i> ER.	—	Leina Wa (R/I/394)

<i>Gryphaena strictula</i> ER.	—	(1886) Leina Wa, Münsa (R/I/394)
<i>Gryphaena polita</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche (R/I/395)
<i>Oligota flavicornis</i> LAC.	—	Leina Wa (R/I/389)
<i>Hygronoma dimidiata</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche (R/I/389)
<i>Pronomaea rostrata</i> ER.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba (R/I/388)
<i>Myllaena dubia</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche (R/I/386)
<i>Myllaena intermedia</i> ER.	—	Leina Lendeteiche (R/I/386)
<i>Myllaena infusata</i> KR.	—	Altenburg (R/I/388)
<i>Myllaena brevicornis</i> MATTH.	—	(1886) Leina Fürstenteiche (R/I/387)
<i>Dinopsis erosa</i> STEPH.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/385)
<i>Trychophora pilicornis</i> GYLL.	—	(1920) Kammerforst Wa (R/I/385)
<i>Phloeocharis subtilissima</i> MANNH.	—	Leina Sprotte Ba (R/I/203)
<i>Hypocyptus longicornis</i> PAYK.	—	Paditz (R/I/383)
<i>Conosoma bipunctatus</i> GRAV. (auch <i>C. bipunctatum</i>)	—	Klausa, Paditz (R/I/370)
<i>Conosoma littoreus</i> LIN. (auch <i>C. littoreum</i>)	—	Leina Wa, Paditz (R/I/368)
<i>Conosoma immaculatum</i> STEPH.	—	1963 Leina Wa (T/44)
<i>Tachyporus abdominalis</i> FABR.	—	Wilchwitz Te (R/I/376)
<i>Tachyporus ruficollis</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche (R/I/373)
<i>Tachyporus atriceps</i> STEPH.	—	Leina Lendeteiche (R/I/374)
<i>Tachyporus transversalis</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba (R/I/373)
<i>Tachyporus hypnorum</i> FABR.	—	(1902) Leina Wa (R/I/375)
<i>Tachyporus pusillus</i> GRAV.	—	1954 Leina Wa (T/44)
<i>Tachinus scapularis</i> STEPH.	—	Paditz, Oberlödla Wa (R/I/372)
<i>Tachinus bipustulatus</i> FABR. (auch <i>Tachyporus bipustulatus</i>)	—	Altenburg (R/I/379)
<i>Tachinus pallipes</i> GRAV.	—	Leina Wa (R/I/379)
<i>Tachyporus subterraneus</i> LIN. (bei REITTER Gattung <i>Tachinus</i>)	—	Paditz (R/I/379)
<i>Tachinus fimetarius</i> GRAV.	—	Leina Wa, Altenburg (R/I/379)
<i>Tachinus laticollis</i> GRAV.	—	Paditz (R/I/380)
<i>Tachinus marginellus</i> FABR.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/381)
<i>Tachinus collaris</i> GRAV.	—	Paditz (R/I/381)
	—	Leina Wa, Altenburg (R/I/382)

<i>Habrocerus capillaricornis</i> GRAV. —	Altenburg (R/I/285)
(Obwohl nur der Gattungsname angegeben ist, kann es sich nur um diese Art handeln, da nur eine Art dieser Gattung bekannt ist.)	
<i>Mycetoporus longicornis</i> MÄKL. —	Leina Wa (R/I/358)
<i>Mycetoporus splendidus</i> GRAV. —	Leina Wa (R/I/358)
<i>Mycetoporus brunneus</i> MRSH. —	Leina Wa, Lossen, Paditz (R/I/359)
<i>Mycetoporus longulus</i> MANNH. —	Leina Wa (R/I/360)
<i>Mycetoporus bimaculatus</i> LAC. —	Leina Wa (R/I/360)
<i>Mycetoporus punctatus</i> GYLL. —	Paditz (R/I/363)
(bei REITTER <i>M. punctus</i> GYLL.)	
<i>Mycetoporus rufescens</i> STEPH. —	Altenburg (R/I/362)
<i>Mycetoporus baudueri</i> REY. —	Leina Wa (R/I/359)
<i>Mycetoporus forticornis</i> FAUV. —	Leina Wa (R/I/360)
<i>Mycetoporus clavicornis</i> STEPH. —	Paditzer Schanzen (R/I/361)
<i>Mycetoporus ruficornis</i> KR. —	Leina Wa (R/I/360)
<i>Bryocharis cingulata</i> MANNH. —	Leina Lendeteich (R/I/367)
(auch <i>B. cingulatus</i>)	
<i>Bryocharis analis</i> PAYK. —	Leina Lendeteich, Klaus a (R/I/367)
— 1960	Leina Wa (T/44)
<i>Bryocharis inclinans</i> GRAV. —	Leina Wa, Kammerforst Wa (R/I/367)
<i>Bryocharis formosa</i> GRAV. —	Leina Lendeteich, Klaus a (R/I/368)
(auch <i>B. formosus</i>)	
<i>Bryoporus cernuus</i> GRAV. —	Kammerforst Wa (R/I/364)
<i>Bolitobius striatus</i> OLIV. —	Leina Wa (R/I/364)
(bei REITTER unter der Gattung <i>Carphacis</i>)	
<i>Bolitobius trinotatus</i> ER. —	Leina Wa bei Klaus a (R/I/364)
<i>Bolitobius exoletus</i> ER. — 1960	Leina Wa (T/44)
<i>Bolitobius thoracicus</i> FABR. —	Paditz (R/I/365)
(auch <i>B. pygmaeus</i> FABR.)	
<i>Heterothops praevia</i> ER. —	Leina Wa (R/I/356)
<i>Heterothops dissimilis</i> GRAV. —	Leina Wa (R/I/356)
<i>Quedius longicornis</i> KR. —	Altenburg (R/I/342)
<i>Quedius ventralis</i> ARAG. —	1888, 1902 Leina Wa (R/I/345)
— (1913)	Kammerforst Wa (R/I/345)
<i>Quedius brevis</i> ER. —	Leina Wa, Paditz (R/I/342)

<i>Quedius scitus</i> GRAV.	—	Kammerforst Wa (R/I/347)
<i>Quedius mesomelinus</i> MRSH.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/345)
<i>Quedius maurus</i> SAHLBG.	—	Altenburg (R/I/346)
<i>Quedius ochripennis</i> MEN.	—	Kotteritz (R/I/344)
	—	Leina Wa (R/I/344)
<i>Quedius puncticollis</i> THOMS.	—	Altenburg (R/I/344)
(bei REITTER diese Art als Syn. für <i>Q. ochripennis</i> angegeben)		
<i>Quedius fulgidus</i> FABR.	—	Leina Wa, Paditz, Kotteritz (R/I/344)
<i>Quedius cinctus</i> PAYK.	—	Leina Wa, Paditz (R/I/347)
<i>Quedius fuliginosus</i> GRAV.	— 1962	Leina Wa (T/n)
<i>Quedius molochinus</i> GRAV.	—	Altendorf, Nobitz (R/I/349)
<i>Quedius fumatus</i> STEPH.	—	Leina Wa (R/I/350)
<i>Quedius picipes</i> MANNH.	—	Klausa (R/I/349)
<i>Quedius umbrinus</i> ER.	—	Leina Fürstenteich, Windischleuba Te (R/I/350)
<i>Quedius nigriceps</i> KR.	— (1906)	Kammerforst Wa (R/I/351)
<i>Quedius maurorufus</i> GRAV.	—	Leina Fürstenteich, Kammerforst, Windisch- leuba Te (R/I/352)
<i>Quedius scintillans</i> GRAV.	—	Leina Wa (R/I/353)
<i>Quedius fulvicollis</i> STEPH.	— (1886, 1902)	Leina Fürstenteiche (R/I/355)
<i>Quedius boops</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche (R/I/354)
<i>Emus hirtus</i> LIN.	—	Leina Wa, Altenburg (R/I/341)
<i>Creophilus maxillosus</i> LIN.	— 1970	Altenburg (N)
<i>Staphylinus pubescens</i> DEG.	—	Paditz (R/I/330)
<i>Staphylinus erythropterus</i> LIN.	— 1963	Leina Wa (T/n)
<i>Staphylinus fuscatus</i> GRAV.	—	Altenburg (R/I/336)
(auch <i>Pseudocypus fuscatus</i>)	— 1958	Leina Wa (T/42)
	— 1943, 1949	Leina Wa (T/2/34)
<i>Staphylinus aeneocephalus</i> DEG.	—	Leina Wa, Altenburg (R/I/337)
<i>Staphylinus similis</i> FABR.	— 1949	Leina Wa (T/2/33)
<i>Staphylinus macrocephalus</i> GRAV.	—	Leina Wa (R/I/335)
<i>Staphylinus ater</i> GRAV.	—	Altenburg (R/I/338)
<i>Hesperus rufipennis</i> GRAV.	— (1902)	Leina Wa (R/I/306)
<i>Actobius cinerascens</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/304)
<i>Actobius signaticornis</i> REY.	—	Windischleuba Te (R/I/305)

<i>Neobisnius villosulus</i> STEPH.	—	Leina, Windischleuba Te (R/I/305)
<i>Neobisnius procerulus</i> GRAV.	—	Leina, Paditz (R/I/305)
<i>Philonthus intermedius</i> LAC.	—	Leina Lendeteiche (R/I/307)
<i>Philonthus umbratilis</i> GRAV.	—	Windischleuba Te, Paditz (R/I/322)
<i>Philonthus cephalotes</i> GRAV.	—	Paditz, Leina (R/I/320)
<i>Philonthus sordidus</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche (R/I/321)
<i>Philonthus spermophili</i> GANGLB.	—	Altenburg (R/I/321)
<i>Philonthus fimetarius</i> GRAV.	— 1930	Maltis (T/41)
<i>Philonthus immundus</i> GYLL.	—	Altendorf, Leina (R/I/314)
<i>Philonthus debilis</i> GRAV.	—	Paditz (R/I/315)
<i>Philonthus sanguinolentus</i> GRAV.	—	Leina Wa, Kammerforst Wa (R/I/313)
<i>Philonthus coruscus</i> GRAV.	—	Leina Wa (R/I/312)
<i>Philonthus corvinus</i> ER.	—	Lossen, Klaus, Leina Lendeteiche, Kammerforst, Windischleuba Re (R/I/323)
<i>Philonthus quisquiliarius</i> GYLL.	—	Leina (R/I/324)
<i>Philonthus longicornis</i> STEPH.	—	Leina Wa bei Klaus (R/I/318)
<i>Philonthus varians</i> PAYK.	—	Leina (R/I/319)
<i>Philonthus fumarius</i> GRAV.	—	Leina, Kammerforst, Windischleubaer Teiche (R/I/324)
<i>Philonthus nigrutilus</i> GRAV.	—	Altenburg (R/I/329)
<i>Othius melanocephalus</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche (R/I/303)
<i>Othius myrmecophilus</i> KIESW.	—	Leina (R/I/304)
<i>Baptolinus affinis</i> PAYK.	— 1961	Leina (T/42)
	—	Kammerforst, Leina (R/I/303)
<i>Xantholinus lentus</i> GRAV.	—	Kammerforst (R/I/302)
<i>Xantholinus punctulatus</i> PAYK.	—	Leina, Paditz (R/I/298)
<i>Xantholinus glaber</i> NORDM.	—	Paditz (R/I/300)
<i>Xantholinus linearis</i> OLIV.	—	Leina (R/I/301)
<i>Xantholinus distans</i> REY.	—	Leina (R/I/301)
<i>Cryptobium fracticorne</i> PAYK.	—	Altenburg (R/I/296)
<i>Lathrobium quadratum</i> PAYK.	—	Windischleuba Te (R/I/289)
<i>Lathrobium terminatum</i> GRAV.	— (1906)	Windischleuba Te, Wiesen, Leina Lendeteiche, Haselbach Te (R/I/290)
<i>Lathrobium fulvipenne</i> GRAV.	—	Altenburg (R/I/292)
<i>Lathrobium laevipenne</i> HEER	—	Leina Lendeteiche (R/I/292)

<i>Lathrobium geminum</i> KR.	—	Windischleuba Te (R/I/291)
<i>Lathrobium brunnipes</i> FABR.	—	Windischleuba Te (R/I/293)
<i>Lathrobium filiforme</i> GRAV.	—	Kammerforst Tü (R/I/294)
<i>Lathrobium longulum</i> GRAV.	1959	Leina (T/39)
<i>Lathrobium pallidum</i> NORDM.	—	Leina (R/I/295)
<i>Domene scabricollis</i> ER.	—	Leina (R/I/288)
<i>Medon castaneus</i> GRAV.	—	Altenburg (R/I/285)
<i>Medon brunneus</i> ER.	—	Leina (R/I/286)
<i>Medon obsoletus</i> NORDM.	—	Windischleuba Te (R/I/287)
<i>Lithocharis ochracea</i> GRAV.	—	Leina, Paditz (R/I/285)
<i>Scopaeus laevigatus</i> GYLL.	—	Windischleuba Te (R/I/284)
<i>Scopaeus gracilis</i> SPERK.	—	Leina Lendeteiche (R/I/284)
<i>Stilicus rufipes</i> GERM.	—	Altenburg (R/I/281)
<i>Astenus filiformis</i> LATR.	—	Leina (R/I/267)
<i>Astenus immaculatus</i> STEPH.	—	Leina Lendeteiche (R/I/277)
<i>Paederus brevipennis</i> LAC.	—	Leina, Lossen, Kammerforst (R/I/280)
<i>Euaesthetus bipunctatus</i> LJUNGH.	—	Leina Lendeteiche (R/I/275)
<i>Euaesthetus ruficapillus</i> LAC.	—	Leine Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/275)
<i>Stenus biguttatus</i> LIN.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/252)
<i>Stenus fossulatus</i> ER.	—	Leina (R/I/257)
<i>Stenus juno</i> PAYK.	—	Leina Lendeteiche (R/I/254)
<i>Stenus lustrator</i> ER.	—	Leina (R/I/257)
<i>Stenus clavicornis</i> SCOP.	—	Leina Lendeteiche (R/I/255)
<i>Stenus pusillus</i> STEPH.	—	Leina (R/I/261)
<i>Stenus circularis</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche, Windischleubaer Wiesen (R/I/262)
<i>Stenus incrassatus</i> ER.	—	Leina Lendeteiche (R/I/259)
<i>Stenus bupthalmus</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/258)
<i>Stenus morio</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche, Leina bei Klausä Tü (R/I/260)
<i>Stenus fuscipes</i> GRAV.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/263)
<i>Stenus binotatus</i> LJUNGH.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/269)
<i>Stenus picipennis</i> ER.	—	Windischleuba Te (R/I/271)
<i>Stenus bifoveolatus</i> GYLL.	—	Leina Lendeteiche (R/I/271)
<i>Stenus picipes</i> STEPH.	—	Leina, Kammerforst (R/I/270)

<i>Stenus flavipes</i> STEPH.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/272)
<i>Stenus impressus</i> GERM.	—	Leina Lendeteiche, Paditzer Schanzen (R/I/273)
<i>Stenus pallipes</i> GRAV.	—	Leina (R/I/274)
<i>Stenus crassus</i> STEPH.	—	Windischleuba Te (R/I/265)
<i>Stenus latifrons</i> ER.	—	Windischleuba Te, Wiesen, Leina Fürsten- und Lende- teiche, Haselbach Te (R/I/266)
<i>Stenus fulvicornis</i> STEPH.	—	Leina (R/I/266)
<i>Stenus tarsalis</i> LJUNGH.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/267)
<i>Stenus cicindeloides</i> SCHALL.	—	Leina Lendeteiche (R/I/268)
<i>Oxyporus rufus</i> LIN.	— 1969	Deutsches Holz Wa (N)
	— 1976	Altenburg (N)
<i>Bledius cribricollis</i> HEER	—	Teiche in der Leina bei Klausa (R/I/250)
<i>Bledius longulus</i> ER.	—	Leina (R/I/248)
<i>Bledius opacus</i> BLOCK.	—	Leina (R/I/284)
<i>Bledius fracticornis</i> PAYK.	—	Leina (R/I/249)
<i>Platystethus cornutus</i> GRAV.	— 1949	Leina (T/35)
<i>Oxytelus rugosus</i> FABR.	—	Paditz (R/I/238)
<i>Oxytelus laqueatus</i> MRSH.	—	Paditz (R/I/240)
<i>Oxytelus inustus</i> GRAV.	—	Paditz (R/I/241)
<i>Oxytelus sculpturatus</i> GRAV.	—	Kammerforst (R/I/241)
<i>Oxytelus nitidulus</i> GRAV.	—	Paditz (R/I/242)
<i>Oxytelus complanatus</i> ER.	—	Paditz (R/I/242)
<i>Oxytelus saulcyi</i> PAND.	—	Altenburg (R/I/243)
	—	Altenburg (T/2/10)
<i>Haploderus caelatus</i> GRAV.	—	Paditz (R/I/237)
<i>Trogophloeus memnonius</i> ER.	—	Leina (R/I/234)
<i>Coprophilus striatulus</i> FABR.	—	Leina (R/I/230)
<i>Acrognathus mandibularis</i> GYLL.	—	Leina bei Klausa (R/I/231)
<i>Orochares angustatus</i> ER.	—	Altenburg (R/I/221)
<i>Acidota crenata</i> FABR.	—	Leina Lendeteiche (R/I/225)
<i>Acidota cruentata</i> MANNH.	—	Altenburg (R/I/225)
<i>Olophrum fuscum</i> GRAV.	—	Windischleuba Te (R/I/224)
<i>Arpedium quadrum</i> GRAV.	—	Windischleuba Te, Wilch- witz Te, Leina Lendeteiche (R/I/224)
<i>Xylodromus testaceus</i> ER.	— 1906	Kammerforst, Leina (R/I/221)

<i>Xylodromus concinnus</i> MRSH.	—	Paditz (R/I/220)
<i>Xylodromus affinis</i> GERH.	—	Altenburg (R/I/219)
<i>Phloeonomus monilicornis</i> GYLL.	—	Altenburg (R/I/218)
<i>Phloeonomus pusillus</i> GRAV.	—	Leina (R/I/219)
<i>Phloeonomus minimus</i> ER.	—	Leina (R/I/219)
<i>Phloeonomus planus</i> PAYK.	—	Leina (R/I/218)
(diese Art bei REITTER nicht angegeben)		
<i>Omalium rivulare</i> PAYK.	—	Paditz (R/I/216)
	— 1957	Maltiz (T/32)
<i>Phyllodrepa floralis</i> PAYK.	—	Paditz (R/I/214)
<i>Phyllodrepa melanocephala</i> FABR.	—	Altenburg (R/I/215)
<i>Phyllodrepa ioptera</i> STEPH.	—	Paditz (R/I/215)
<i>Acrolocha striata</i> GRAV.	—	Altenburg (R/I/213)
<i>Anthobium marshami</i> FAUV.	— 1913	Kammerforst (R/I/209)
<i>Megarthus sinuatocollis</i> LAC.	—	Leina (R/I/205)
<i>Megarthus denticollis</i> BECK.	—	Paditz, Wilchwitz Te (R/I/205)
<i>Microlepus porcatus</i> FABR.	—	Paditz (R/I/203)

19. *Pselaphidae*

<i>Trimium brevicorne</i> REICHB.	—	Altenburg (R/I/495)
<i>Bibloporus bicolor</i> DENNY.	—	Altenburg (R/I/498)
<i>Euplectus piceus</i> MOTSCH.	— (1922)	Altenburg (R/I/496)
<i>Euplectus nanus</i> REICHB.	—	Leina (R/I/496)
<i>Euplectus punctatus</i> MULS.	— (1902)	Leina, Kammerforst (R/I/497)
<i>Euplectus karsteni</i> REICHB.	—	Leina, Paditz (R/I/498)
<i>Trichonyx sulcicollis</i> REICHB.	—	Paditz (R/I/499)
<i>Batrissodes delaporteae</i> AUBÉ.	—	Leina (R/I/499)
<i>Bryaxis longicornis</i> LEACH.	—	Leina Lendeteiche, Wilchwitz Te, Haselbach Te (R/I/503)
(auch <i>B. sanguinea</i> LIN.)	—	
<i>Reichenbachia juncorum</i> LEACH.	—	Leina (R/I/502)
<i>Reichenbachia impressa</i> PANZ.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/502)
<i>Brachygluta fossulata</i> REICHB.	—	Leina Lendeteiche (R/I/502)
(Bei REITTER ist <i>Brachygluta</i> als Untergattung zu <i>Reichenbachiana</i> angegeben)	—	

<i>Brachygluta haematica</i> REICHB.	—	Leina (R/I/502)
<i>Bythinus clavicornis</i> PANZ.	—	Leina bei Klausä (R/I/504)
<i>Bythinus bulbifer</i> REICHB.	—	Leina Lendeteiche, Windischleuba Te (R/I/503)
<i>Bythinus curtisi</i> LEACH.	—	Paditzer Schanzen, Paditz, Klausä, Windischleuba Te (R/I/504)
<i>Bythinus securiger</i> REICHB.	—	Altenburg (R/I/505)
<i>Bythinus burellii</i> DENNY.	—	Paditzer Schanzen (R/I/505)
<i>Tychus niger</i> PAYK.	—	Paditzer Schanzen (R/I/506)
<i>Pselaphaulax dresdensis</i> HRBST.	—	Leina Lendeteiche
<i>Anisoloma castanea</i> HRBST.	— 1967	Leina Wa (T/n)
(Diese Art auch zur Gattung <i>Loides</i> der Familie <i>Silphidae</i> zugeordnet (REITTER Band II, Seite 255))		

(Fortsetzung folgt)

Eingang: 3. 5. 1977

Anschrift des Verfassers:

ERWIN NAUMANN, DDR-74 Altenburg, Beim Goldenen Pflug 1